

Gonorré



och sex män emellan



Gonorré orsakas av en bakterie och överförs vid oskyddade sexuella kontakter. Från att ha legat på samma höga nivå som dagens klamydia, minskade gonorrén kraftigt under 1980-talet.

De senaste åren har antalet gonorréfall åter börjat stiga.

Cirka 2/3 av fallen är män. Av dessa är ungefär hälften män som har sex med män (MSM) och där har också ökningen varit som störst.

En klar majoritet av alla fall smittas i Sverige, men smitta i länder som Thailand, Spanien och Tyskland är inte ovanligt. På många håll i världen är gonorré en vanlig sexuell infektion som dessutom blir allt mer motståndskraftig mot antibiotika.

Läs mer om gonorré och hur du kan skydda dig mot överföring.

Gonorré och symtom

Gonorré är ofta helt symtomfri och man kan vara bärare länge och ändå vara smittsam. Bakterien kan finnas i urinröret, ändtarmen och svalget men kan också ibland ge ögoninfektion. Det vanligaste tecknet på att man har gonorré är flytningar och sveda i samband med vattenkastning. Flytningar från ändtarmen och ont i halsen är andra möjliga symtom. En obehandlad infektion kan leda till sterilitet genom inflammation i bitesticklarna.

Var kan jag testa mig?

Du kan testa dig på hud-/köns-/STI-mottagningar på de större sjukhusen, på infektionsmottagningar, vårdcentraler och om du är under 25 år på ungdomsmottagningar.

I Göteborg finns även Sahlgrenska Könsmottagningen Gayhälsan och Sexualmedicinskt Centrum.

Vanliga frågor

Vid vilka sexuella praktiker kan jag få gonorré?

Gonorré är mycket smittsamt. Bakterierna kan finnas i urinröret, ändtarmen och svalget så både oralsex och analsex kan smitta. Bakterierna kan också överföras vid onani via fingrarna till ögonen. Du kan också få gonorré om du delar sexleksaker med någon.

Hur kan jag få veta om jag har gonorré?

Numera räcker det med ett vanligt urinprov för att få veta om man har gonorré i urinröret. Beroende på sexuell praktik kan man behöva komplettera med pinnprov från ändtarmen och svalget. Hittar man bakterien vid ett urinprov måste det följas upp med ett pinnprov från urinröret, för odling, så att man kan testa vilken antibiotika som fungerar. Odling brukar nästan alltid tas på en hud-/köns-/STI-mottagning.

Går gonorré att behandla?

Ja, men gonorrébakterien kan vara resistent (motståndskraftig) mot vissa av de antibiotika som man brukar använda.

Ett urinprov kan inte avgöra om det finns en resistens.

Därför måste man alltid ta en bakterieodling före behandlingen påbörjas, oftast på en hud-/köns-/STI-mottagning där det finns specialistkompetens. Kontrollprov tas alltid för att se att behandlingen lyckats. Sexuella kontakter måste också undersökas och behandlas. Gonorré är en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen, vilket innebär att du har rätt till kostnadsfri provtagning och behandling.

Obehandlad gonorré kan ge upphov till följsjukdomar, såsom inflammation i bitestikeln, vilket kan leda till sterilitet. Man kan också få ögon- och ledinflammation.

Uad händer om jag samtidigt har en annan sexuell infektion?

Gonorré i svalget, urinröret och ändtarmen ökar risken att bli smittad med hiv om man har oskyddad sex. Risken för gonorré är större vid oskyddad sex mellan hivpositiva, troligen för att infektionen är vanligare i denna grupp.

Hur gör jag sexet säkrare?

Kondom, tillsammans med vattenbaserat glidmedel, är ett relativt säkert skydd mot gonorré och andra sexuellt överförda sjukdomar. Kondom skyddar också vid oralsex. Dela inte dina sexleksaker med andra.

Denna broschyr är utarbetad av

Smittskydd Västra Götaland och
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Broschyren är framtagen 2016 med ekonomiskt stöd från statsanslaget, Insatser mot hiv, aids och andra smittsamma sjukdomar, som syftar till att nå målen i den Nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (Prop. 2005/06:60)

Mer information finner du på

www.narhalsan.se/ksh
www.vgregion.se/smittskydd
www.1177.se