

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Stina Berver, (stibe5), Specialistläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-04

Giltig till: 2026-09-04

Kortisonbehandling hos förlossningspatienter

Sammanfattning

Förlossningspatienter som behandlas med kortison kan ha en hämning av binjurebarkens stressvar. Riktlinjen innehåller information om vid vilka kortisondoser extra substitution bör ges och hur den genomförs.

Förutsättningar

Hämning av binjurebarkens produktion av steroider kan föreligga vid medicinerig med kortison. Följande perorala dosering prednisolon anses inte hämma binjurebarkens stressvar,

50 mg eller mindre varannan dag

10 mg eller mindre i en dos per dag

7,5 mg delat i två doser dagligen

Patienter som under de tre senaste månaderna haft högre doser än detta i mer än en vecka ska ha substitution.

Utvärtes kortisonsalva, -kräm eller –suppositorier anses trygga att användas under graviditeten.

Genomförande

Se sjukhusövergripande riktlinje [Kortisonbehandling i samband med operation.](#)

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Stina Berver, specialistläkare, kvinnokliniken, SÄS, Borås

Fastställt av

Karolina Andersson, verksamhetschef, VO Kvinna och barn,
SÄS, Borås

Nyckelord

kortikosteroider, kollagenoser, hypofysektomi, binjure, kortisolbrist,
förlossning

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Stina Berver, (stibe5), Specialistläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9641-1173499273-100

Version: 7.0

Giltig från: 2024-09-04

Giltig till: 2026-09-04