

Laparoskopi "titthålsoperation" - hemgångsinformation

Du har genomgått en laparoskopisk operation. För att operatören skall kunna arbeta med "titthålsinstrumentet" i magen har denna fyllts med gas (koldioxid). Denna gas tappas ut då operationen avslutats. Under operationen har andningen skötts genom en tub (slang) i luftstrupen. Därför kan du känna en irritation i halsen de närmaste dygnet.

Du får inte köra bil och bör ta det lugnt resten av dygnet. Ät gärna lättsmält mat idag.

De små såren på magen har slutits med stygn som inte behöver tas bort. Du ska ta bort förbanden efter fem dagar. Du kan duscha trots att förbanden sitter kvar.

Vi har tappat urinblåsan på urin, varför det kan svida lite när du kissar. Det kan också blöda lite från slidan de närmsta 1–2 dygnet på grund av att vi använt en tång på livmodertappen under ingreppet.

Nästan alla patienter får ont i axlarna operationsdagens kväll, och framför allt dagen efter. Besvären ökar vid djupa andetag. Detta är inte farligt och du kan ta till exempel paracetamol (Alvedon, Panodil) eller ibuprofen (Ipren).

Vid behov kan du själv sjukskriva dig i upp till sju dygn.

Om du får ihållande illamående, kräkningar, kraftiga buksmärter, feber över 38 grader, rikliga blödningar eller andra oroande besvär, skall du kontakta **Kvinnoklinikens mottagning**, tfn: **033 – 616 17 00**.

Telefontid måndag – torsdag 07:00-16:00 samt fredag 07:00-15:00.

Övrig tid kontaktas **Sjukvårdsrådgivningen**, tfn **1177**.

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Asmaa Soubhi Said, (asmso), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9641-1173499273-101

Version: 7.0

Giltig från: 2025-06-13

Giltig till: 2027-06-12