

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2025-09-15

Innehållsansvar: Sinnika Olsson, (sinpe), Ivasjuksköterska

Giltig till: 2027-01-15

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

# Patientnära städning - intensivvård

## Innehållsansvariga:

Sinnika Olsson, IVA-sjuksköterska, SkaS Skövde

Camilla Andersén, enhetschef IVA, SkaS Skövde

## Revideringar i denna version

Uppdatering av innehållsansvariga.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Daglig patientnära städning, intensivvård.

## Arbetsbeskrivning

Daglig städning av IVA-plats ska ske 1 gång/dygn och vid behov.

Städningen ska dateras och signeras av den som utfört den, d v s salsansvarig.

## Tagyta

- Säng - patientsängens samtliga delar (underrede vid behov)
- Sängbord
- Skåp
- Vagg-/instrumentpanel
- Vikvägg
- Medicinteknisk utrustning - (övervakningsskåp, droppställningar, volympumpar, patientlift m m)

## Punktstädning

Utförs direkt vid spill av t ex dryck

Spill torkas upp direkt med vatten och eventuellt rengöringsmedel.

Använd engångsduk.

### **Daglig desinfektion**

Av tagytor utförs med ytdesinfektion med tensid.

**OBS!** vid Clostridioides difficile eller gastroenterit ska Incidin OxyFoam S användas.

### **Punktdesinfektion**

Utförs direkt vid föroreningar av kroppsvätskor/utsöndringar. Stor förorening tas upp med absorberande material.

Använd handskar och eventuellt plastförkläde

Bearbeta (mekanisk rengöring) spill och stänk med engångsduk indränkt i desinfektionsmedel.

Effekten är uppnådd när medlet torkat in

### **Slutstädning**

All inredning och hjälpmedel rengörs/desinfekteras. Viktigt med mekanisk rengöring.

Desinfektera och rengör all utrustning vid sängplatsen.

Oanvänt material för engångsbruk kasseras om det varit i patientens omedelbara närhet och förvarats utan skydd för damm och stänk.

Töm soppåsen.

Golv torkas av vid behov (rengöringsmedel och vatten).

Vid vård av patient med MRB på ex isoleringsrum.

Toalettborste byts ut.

Toalettrullen byts.

Desinfektera tagytor på toaletten (ex kranar, handtag, spolknopp och handfat).

Infektion	Punktdeinfektion	Daglig desinfektion av tagytor	Slutstädning	Medicinteknisk Utrustning
Blodsmitta Hepatit B,C HIV	Ytdeinfektion med tensid	Ytdeinfektion med tensid	Ytdeinfektion med tensid.	Se separat lista
Clostridioides difficile	Incidin OxyFoam S	Incidin OxyFoam S	Incidin OxyFoam S	Se separat lista
ESBL	Ytdeinfektion med tensid	Ytdeinfektion med tensid	Ytdeinfektion med tensid	Se separat lista
Influensa	Ytdeinfektion med tensid	Ytdeinfektion med tensid	Ytdeinfektion med tensid	Se separat lista
MRSA	Ytdeinfektion med tensid	Ytdeinfektion med tensid	Ytdeinfektion med tensid	Se separat lista
Smittsam tuberkulos	Ytdeinfektion med tensid	Ytdeinfektion med tensid	Ytdeinfektion med tensid	Se separat lista
VRE	Ytdeinfektion med tensid	Ytdeinfektion med tensid	Ytdeinfektion med tensid	Se separat lista
Gastroenterit	Incidin OxyFoam S	Incidin OxyFoam S	Incidin OxyFoam S	Se separat lista
Coronavirus-infektion	Ytdeinfektion med tensid	Ytdeinfektion med tensid	Ytdeinfektion med tensid	Se separat lista

Hur man upplever lukt och ångor av kemiska ämnen är individuellt.  
OxyFoam S alkoholbaserad ytdeinfektion är inte farlig om man använder det på rätt sätt.

När större ytor ska städas kan man byta ut YT-DES mot OxyFoam S för att slippa den skarpa doften från spriten.

Incidin OxyFoam S finns i 1-liters sprejflaska och i 5-liters dunk för att rengöra större ytor.

### **Alkoholbaserad ytdeinfektion med tensider**

Finns i 1-liters plastflaskor och 5-liters plastdunk.

Alkoholbaserad ytdeinfektionsmedel är effektivt mot svamp, virus med hölje och de flesta bakterier. Däremot är effekten ringa eller ingen alls mot bakteriesporer (ex sporer efter clostridioides difficile) och nakna virus (ex ”kräksjukevirus”, calici).

De flesta material tål alkoholbaserat desinfektionsmedel men det kan verka uttorkande för vissa plaster och gummi, vid frekvent användning.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Alkoholer i den här formen verkar uttorkande på huden. Använd handskar och skydda ögonen från stänk. Ångor i höga halter kan irritera luftvägar och ge huvudvärk, trötthet och illamående. Överkänslighet mot alkoholer är sällsynt.

Alkoholer kan hällas ut i avloppet utan miljöpåverkan.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE An Op IVA

**Innehållsansvar:** Sinnika Olsson, (sinpe), Ivasjuksköterska

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1),  
Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9696-242963441-92

**Version:** 11.0

**Giltig från:** 2025-09-15

**Giltig till:** 2027-01-15