

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Giltig från: 2025-12-29

Innehållsansvar: Torun Bergdahl, (torbe8), Överläkare

Giltig till: 2027-12-31

Granskad av: Josefine Hätting, (josos), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Diabetesdebut – Hyperglykemi - barn

Revideringar i denna version

Justering markerat med gult.

Bakgrund, syfte och mål

Vägledning vid nydebuterad diabetes.

Arbetsbeskrivning

Kapillär provtagning: kP-glukos, kB-ketoner, syra-basstatus, kP-Na. OBS! Akut svar
Klinisk bedömning, vikt.

Opåverkad patient:

Emla 1 h,

Dehydrerad, påverkad patient:

Sätt 2 iv nålar

Venös provtagning;

P-glukos

Blodstatus, CRP

Syra-bas status, (resp), b-ketoner

El-status (Na, K, CL, alb, kreatinin)

p-osmolalitet, p-urea

Övrig provtagning:

TSH, T4, transglutaminas ak, **p-TPO-ak**

D-vitamin, HbA1c

[BDD prover](#)

PROVSVAR: pH

pH >7.3



Sätt 1 iv nål

Venös provtagning:

P-glukos, Blodstatus, ketoner

CRP, Na, K, HbA1c

Övrig provtagning:

TSH, T4, transglutaminas ak, D-vitamin, **p-TPO-ak**

[BDD prover](#)

pH <7.3



följ styrdokument:

[Diabetes med ketoacidosis - barn](#)

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Följ styrdokument:

[Diabetes, nydebuterad utan ketoacidosis – insulin iv](#)

alt

[Diabetesdebut utan ketoacidosis – ordinationsschema subcutan insulinbehandling](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Innehållsansvar: Torun Bergdahl, (torbe8), Överläkare

Granskad av: Josefine Hätting, (josos), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9699-1702881381-50

Version: 11.0

Giltig från: 2025-12-29

Giltig till: 2027-12-31