

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Giltig från: 2024-11-18

Innehållsansvar: Magnus Lindqvist, (magli1), Överläkare

Giltig till: 2026-11-30

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Inflammatorisk tarmsjukdom - PUCAI

Revideringar i denna version

Förlängt giltighetstiden.

Bakgrund, syfte och mål

PUCAI är ett pediatrikt aktivitetsindex som rekommenderas som stöd vid handläggning av svårt kolitskov (UC/Crohn).

Arbetsbeskrivning

Skattning av PUCAI beräknas på de två senaste dygnens sjukdomsaktivitet förutom vid snabba förändringar som vid akut svår kolit då daglig beräkning kan behövas.

Datum						
Beräkning av PUCAI-index Buksmärta (0-10 poäng) 0 Ingen 5 Smärta som kan ignoreras 10 Smärta som inte kan ignoreras						
Blodiga avföringar (0-30 poäng) 0 Inget blod 10 Lite blod i mindre än hälften av avföringarna 20 Lite blod i mer än hälften av avföringarna 30 Mycket blod (>50% av avföring)						

Avföringskonsistens (0-10 poäng) 0 Formad avföring 5 Delvis formad avföring 10 Lös avföring						
Antal avföringar per dygn (0-15 poäng) 0 0-2 avföringar 5 3-5 avföringar 10 6-8 avföringar 15 >8 avföringar						
Nattliga tarmtömningar (0-10 poäng) 0 Nej 10 Ja						
Aktivitetsnivå (0-10 poäng) 0 Ingen begränsning av aktivitet 5 Någon gång begränsad aktivitet 10 Allvarlig begränsad aktivitet						
Summa:						

Begreppsdefinition med ledning av PUCAI Remission < 10 Milt skov av UC 10-34 Måttligt skov av UC 35-64 Svårt skov av UC ≥ 65-85 Respons på terapi: Minskning med 20 poäng

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Innehållsansvar: Magnus Lindqvist, (magli1), Överläkare

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9699-1702881381-7

Version: 9.0

Giltig från: 2024-11-18

Giltig till: 2026-11-30