

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra

Giltig från: 2025-12-19

Innehållsansvar: Annelie Raidla Lund, (annra23), Sjuksköterska

Giltig till: 2027-12-18

Granskad av: Alexander Haner, (aleha3), Överläkare

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

Intoxikationer och peroral kol - Akuten

Förändringar sedan föregående version

Inga

Syfte

Patienter som förgiftats med läkemedel, droger eller kemiska medel, avsiktligt eller accidentellt, ska ges ett gott och säkert omhändertagande.

Arbetsbeskrivning

- Triagera patienten
- Ta noggrann anamnes
- Prata med eventuella medföljande; Anhöriga, vänner och ambulanspersonal

Vem larmade?

Vad har patienten tagit och när?

Finns tomma tablettförpackningar?

Alkohol förutom den intagna substansen?

Kräkningar?

Yttre synliga skador?

Om medvetslös patient, hur länge?

Uttalade suicidtankar?

Finns avskedsbrev?

Fråga vaken patient om det finns ytterligare läkemedel/droger bland tillhörigheterna och om du får ta hand om dem. Om patienten är vaken och förgiftningen skett inom 1-2 timmar ska patienten ges aktivt kol (Carbomix 50 g) enligt generell ordination.

Kontraindikationer:

- Patient med sänkt vakenhetsgrad
 - Vid illamående/kräkning
 - Förgiftning med frätande substanser, syra, alkali eller petroleumprodukter t.ex. lampolja.
1. Intag av metaller (järn, litium, elektrolyter). Dessa binds ej till kol.
 2. Intag av främmande kropp, t.ex. batterier
- Buksmärtor (misstanke om ileus/perforation)
3. Ges ej om det är uppenbart att patienten intagit en mindre mängd giftig substans.
 4. Vid allvarlig intoxication: fråga läkare om patienten ska magsköljas.

Övervakning

- Monitorering enligt WEST (varningssymtom orange).
5. Fortlöpande täta vakenhetskontroller. Oftast tätare än kvartskontroller.
 6. Håll uppsikt över patienten. Dessa patienter får inte stänga dörrar på undersökningsrum eller dra för draperier på övervakningsplats om de är ensamma. De får inte heller lämnas ensamma vid toalettbesök.
 7. Placera patienten så att hen hela tiden är under uppsikt.
- Lagg medvetslös patient i stabilt sidoläge.
 - Kontrollera bladderscan på medvetslös/medvetandesänkt patient.

Sök information om ämnets farlighet via Fass eller Giftinformationscentralen. Telefon för vårdgivare 010-4566719 dygnet runt, alt. giftinfo.se

Är patienten under 18 år eller har minderåriga barn ska orosanmälan göras till Socialtjänsten.

Ansvar

Respektive linjefe ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Uppföljning, utvärdering och revision

Revisionsansvarig ansvarar för uppföljning och utvärdering. Avvikelser hanteras enligt SUs riktlinjer för MedControl Pro.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning
Östra

Innehållsansvar: Annelie Raidla Lund, (annra23),
Sjuksköterska

Granskad av: Alexander Haner, (aleha3), Överläkare

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9772-1276147733-81

Version: 7.0

Giltig från: 2025-12-19

Giltig till: 2027-12-18