

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra

Giltig från: 2025-08-22

Innehållsansvar: Kurt Allan Andersson, (kuran2), Överläkare

Giltig till: 2027-08-22

Granskad av: Alexander Haner, (aleha3), Överläkare

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

Intranasal behandling Naloxon – Akuten

Förändringar sedan föregående version

Inga

Syfte

I de akuta fall där patientens tillstånd gör det svårt att administrera läkemedel intravenöst, är intranasal behandling ett alternativ som ger snabbt tillslag och är lätt att utföra.

Arbetsbeskrivning

Indikation: Reversering av opiater, när intravenös behandling inte kan ges.

Kontraindikation: Näsfraktur. Kraftig näsblödning.

Utförande

1. Sug vid behov bort ytligt sekret i båda näsborrarna
2. Kontrollera läkemedelsdosen **Naloxon 0,4 mg/ml**. Vuxendos = 1 ml
3. Dra upp i en 2 ml spruta
4. Sätt in atomiseraren (MAD) i ena näsborren, tryck snabbt in halva dosen (0,5ml). Rikta spetsen bort från nässeptum, snett uppåt mot mellanrummet mellan ögat och örat. Upprepa i andra näsborren.



Ansvar

Sjukvårdspersonal ansvarar för att arbeta utefter denna rutin. Respektive linjechef ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Uppföljning, utvärdering och revision

Revisionsansvarig ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning
Östra

Innehållsansvar: Kurt Allan Andersson, (kuran2), Överläkare

Granskad av: Alexander Haner, (aleha3), Överläkare

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9772-1276147733-84

Version: 8.0

Giltig från: 2025-08-22

Giltig till: 2027-08-22