

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra

Giltig från: 2025-11-25

Innehållsansvar: Johan Ingemarsson, (johin2), Sektionschef

Giltig till: 2027-11-13

Granskad av: Alexander Haner, (aleha3), Överläkare

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

Kräkningar och diarréer - AKUTEN

Förändringar sedan föregående version

Ta caliciprov på patienten om inläggning är aktuell och misstanke om calici kvarstår efter läkarbedömning.

Syfte

Snabbare bedömning på rätt vårdinstans för patienter med misstänkt smittsam gastroenterit. Minskad risk för smittspridning.


Arbetsbeskrivning

Fyll i avsedd ruta på Akutjournal för misstanke om GE.

- Patienten läggs omedelbart på isoleringsrum.
- Informera patient och anhörig om smittrisk och hygienrutiner. Be anhöriga stanna inne på isoleringsrummet.
- Om inga isoleringsrum är tillgängliga; sätt upp en skylt – ISOLERING – på patientrummet samt på den toalett patienten använder. Ställ i första hand in en toastol på rummet.
- Basala hygienrutiner gäller d v s handskar, förkläde, handtvätt med tvål och vatten samt noggrann torkning av händerna; därefter handdesinfektion med 70% handsprit. V b munskydd och visir. Handtvätt ska utföras även om händerna är synligt rena då handsprit inte har fullständig effekt på t ex calicivirus.
- Punktdesinfektera omedelbart med Virkon 1% vid spill samt efter varje toalettbesök (görs av vårdpersonal). Punktdesinfektion samt vanlig städning av rummet.
- Kraftigt förorenad tvätt läggs i upplösbar innerpåse samt gul yttersäck. Förslut påsen på rummet.

- Om patienten ska till röntgen följer Akutmottagningens personal med för att vid behov hjälpa till med hygien. Kontakta röntgenavdelningen och förvarna så de kan göra väntetiden där så kort som möjligt.
- Om inläggning är aktuell och misstanke om calici kvarstår efter läkarbedömning tas caliciprov på patienten så snart det är möjligt för att minimera tiden på akuten.

Arbetsbeskrivning



Uteslut diff.diagnoser med rimlig säkerhet

Akut buk	Hård eller rejält öm buk, buksmärta <i>innan</i>
Hjärtinfarkt	Bröstmärta + EKG-förändringar
Ketoacidosis	Venös blodgas
Stroke	Urakut debut av huvudvärk <i>innan</i> ; fokalneurologi
Pneumoni	Hosta innan
Meningit	Huvudvärk, nackstelhet, medvetandesänkning
Sepsis	Påverkad, cirkulatoriskt instabil, ev. acidosis (blodgas)
Övrigt	Intox, läkemedel (särskilt laxantia), obstipation, antibiotika strålning, cellgifter, IBD

Ansvar

Respektive linjechef ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Uppföljning och utvärdering

Revisionsansvarig ansvarar för uppföljning och utvärdering. Avvikelse hanteras enligt SUs riktlinjer för MedControl Pro.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning
Östra

Innehållsansvar: Johan Ingemarsson, (johin2), Sektionschef

Granskad av: Alexander Haner, (aleha3), Överläkare

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9772-1276147733-90

Version: 11.0

Giltig från: 2025-11-25

Giltig till: 2027-11-13