

Gäller för: Verksamhet AnOplva neonatal barn
Innehållsansvar: Anders Flisberg, (andfl), Överläkare
Godkänd av: Angela Hanson, (angha), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-09-03
Giltig till: 2027-09-03

Kramper, neonatala, hos nyfödda (akutbehandling)

Förändringar sedan föregående version

Överlagd i ny mall

Tillagt länk till nationella riktlinjer för behandling av neonatala kramper

Tillagt text om omvårdnad av barn som krampar

Tillagt länk till exempel på anfallsaktivitet

Utförande

Neurologisektionen i Svenska Neonatalföreningen har tagit fram riktlinjer för medicinsk behandling av neonatala kramper. Läs mer via länken

[Diagnostik och behandling av neonatala anfall](#)

Omvårdnad av barn med kramper

Förberedelser:

1. Ta fram kramplista och tidtagarur
2. [Kramplista.pdf](#)
3. fråga läkare om aEEG skall kopplas upp
4. om prover ordineras sätt PVK

Bilda sig uppfattning om barnets tillstånd genom att lyssna, titta och känna på samt ta kontroller.

Barnet läggs på öppet bord med bäddstöd och tunn filt på med övervärme vid behov. Barn som kylbehandlas vårdas med fördel i vuxensäng.

Inte dra för draperier/skärmar så att man kan se barnet.

Skapa en lugn miljö runt barnet, prata tyst. Engagera föräldrar så att de kan uppmärksamma när barnet krampar och meddela. Föräldrar skall uppmuntras att fortsätta sköta barnets normala omvårdnad.

Uppmärksamma kramper

Symptom som kan indikera på kramper:

5. Oförklarliga desaturationer
6. Hicka
7. Kombination mellan flera oförklarliga symptom
8. Efter kramper
9. Oförklarliga apneer
10. Cyklade rörelser med armar och ben
11. Tuggande
12. Nystagmus
13. Rullar med ögonen bakåt
14. Växlande tonus
15. Slapp tonus efter krampen
16. Skrik efter en kramp

När barn krampar:

17. Starta klocka och observera barnet samt dokumentera.
18. Informera ansvarig läkare
19. Häva kramper genom att hålla om barnet och följa läkarordination

Följ länken nedan för att se exempel på hur anfall kan se ut i registreringen:

[Svenska neonatalföreningen: Exempel på anfallsaktivitet på aEEG](#)

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient.

Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet AnOpIva neonatal barn

Innehållsansvar: Anders Flisberg, (andfl), Överläkare

Godkänd av: Angela Hanson, (angha), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-54

Version: 11.0

Giltig från: 2025-09-03

Giltig till: 2027-09-03