

Gäller för: Verksamhet Infektion

Giltig från: 2025-09-29

Innehållsansvar: Elisabet Lönnermark, (elilo5), Överläkare/Universitetslekt

Giltig till: 2027-09-29

Godkänd av: Anna Grahn, (annpe88), Verksamhetschef

Tuberkulinprovning på Infektionsmottagningen

Denna rutin gäller för

Infektion

Ansvar

Elisabet Lönnermark ansvarar för innehållet i rutindokumentet.

Sjuksköterskor på tuberkulos-sjuksköterskemottagningen ansvarar för att rutinen följs.

Arbetsbeskrivning

Tuberkulin/IGRA-test av vuxna kontakter till tuberkulospatienter utförs vid Infektionsmottagningen, SU/Ö, Barnmedicinmottagningen, DSBS respektive lungmottagningen, Angereds Närsjukhus (ANS). Kontakter som är barn upp till 16 år remitteras till DSBS. Kontakter som bor i Angered, Kortedala eller Bergsjön remitteras till ANS (tel sjuksköterska 031-3326930). Smittspårningarna på patienter från infektionsmottagningen SU/ Ö hålls ihop av sjuksköterskor på infektionsmottagningen.

Tuberkulinprovning (PPD/Mantoux-test/TST) genomförs på ”PPD-mottagning” på infektionsmottagningen SU/Ö helgfria jämna veckor (undantaget semesterperioden) måndag kl. 13-14 med avläsning torsdag kl. 13-14. Vid komplettering med IGRA-test (QuantiFERON) bör detta tas senast samtidigt med PPD-avläsning, eller tidigast två månader efter PPD-sättning, för att undvika falskt positivt IGRA.

Särskilt utbildade sjuksköterskor på Infektionsmottagningen har delegation att självständigt ordinera och utföra tuberkulintest på vuxna (> 16 år) samt skriva remissvar. Tuberkulinprovning kan vara aktuell i samband med kontaktspårning, för studerande som behöver intyg inför

utlandsstudier, som led i tuberkulosutredning, vid bedömning av tuberkulossmitta (LTBI) hos fr a personer där immunhämmande behandling planeras samt inför planerad vaccination med BCG.

För personer som behöver intyg för utlandstjänstgöring eller återkommer från sjukvårdsarbete i utlandet, är IGRA (QuantiFERON) förstahandsval. Tuberkulin är mindre specifikt och reagerar även på icke tuberkulösa mykobakterier samt BCG-vaccination.

BCG-vaccination

BCG-vaccination rekommenderas huvudsakligen till barn t o m 6 års ålder (så länge barnet är inskrivet på BVC). Barn och ungdomar upp till 18 års ålder vaccineras vid aktuell aktiv tuberkulos hos nära anhörig / hushållskontakt och kan övervägas vid längre vistelse (>3 månader) i ett område med hög förekomst av tuberkulos. BCG-vaccination rekommenderas inte för vuxna. Vid tuberkulinreaktion > 0 mm ges inte BCG.

Uppföljning och utvärdering

Revision vartannat år. Elisabet Lönnermark ansvarar för uppföljning och utvärdering.

Granskare

Annette Reul, tuberkulossjuksköterska, Infektionsmottagningen

Panos Vasilakis, vårdenhetschef, Infektionsmottagningen

Aylin Yilmaz, sektionschef, Infektionskliniken

Kunskapsöversikt

[Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos](#) (FoHM, 2022)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Infektion

Innehållsansvar: Elisabet Lönnermark, (elilo5),
Överläkare/Universitetslekt

Godkänd av: Anna Grahn, (annpe88), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9784-44644612-82

Version: 15.0

Giltig från: 2025-09-29

Giltig till: 2027-09-29