

Gäller för: Verksamhet Obstetrik

Giltig från: 2026-01-22

Innehållsansvar: Linda Rilby, (linri1), Barnmorska

Giltig till: 2028-01-22

Granskad av: Erica Ginström Ernstad, (erigi2), Sektionschef

Godkänd av: Anneli Falk, (annfa17), Verksamhetschef

# Rh-negativa mödrar, hantering av blodprov, provsvar och information

## Revideringar i denna version

2026-01-21. Rutinen förlängs, inga medicinska ändringar.

Ersätter version från 2016-10-26. Revideringen gäller: Två barnmorskor kontrollerar att remiss och rör stämmer. Blodgruppering läses alltid i interinfo (ej fax). Rutin för förlossning Mölndal har tagits bort.

Ersätter version från 2021-10-27. Revideringen gäller att blodgruppering för barnet inte behöver tas från navelsträng om kontroll av fetalabldkroppar är gjort under graviditeten efter v 10.

## Arbetsbeskrivning om fetalabldkroppar är kontrollerat under graviditeten

- Ansvarig barnmorska kontrollerar patientens blodgruppering i interinfo. För att säkerställa att det är korrekt ska varje barnmorska själv gå in i interinfo för kontroll och blodgrupp fylls inte i FV1.
- För Rh-negativa patienter kontrolleras att det är taget prov för fetalabldkroppar efter v 10. Fostrets Rh finns dokumenterat under samlade utlåtande med en rekommendation om Rh-profylax ska ges.
- Om patienten har fått Rhophylac de senaste tre veckorna behövs ingen ny dos.
- Registrering av Rhophylac sker i journal, melior och FV1.
- Vid hemgång är det PAB som kontrollerar att patient med Rh negativ blodgrupp vid behov erhållit Rh-profylax samt att det är dokumenterat i journalen.

## Arbetsbeskrivning om analys av fetalabldroppar saknas

- Ansvarig barnmorska tar navelsträngsprov på barnet, kontrollerar att id etiketter på provrör och remiss stämmer och remiss är rätt ifylld.
- Två personer, barnmorska/barnmorska kontrollerar att remiss och rör stämmer före ivägskickande alternativt före utlämnande till transport.
- Om provsvaret ej kommit inom 24 timmar, ansvarar patientansvarig barnmorska (PAB) för att kontakta transfusionsmedicin.
- Blodgruppsvaret skall visas för patienten oavsett om det är positivt eller negativt samt signeras och lämnas till föräldrarna.
- I omedelbar anslutning till att provsvaret visats för patienten, skall injektionen ges om barnets blodgrupp är positiv.
- Registrering av Rhophylac sker i journal, melior och FV1.
- Vid hemgång är det PAB som kontrollerar att patient med Rh negativ blodgrupp vid behov erhållit Rh-profylax samt att det är dokumenterat i journalen.
- Om navelsträngsprov på Rh-negativ kvinna missats ges Rh-profylax för att inte förlora tid. Återkoppla till förlösande barnmorska.
- Rh-profylax skall ges inom 48–72 timmar.
- Ansvarig barnmorska kontrollera barnet blodgruppering svar i interinfo, dokumenterar svaret i barnets journal.

## Ansvar

Gäller för personal inom de enheter/verksamheter som berörs av rutinen.

Ansvar för spridning och implementering har VEC Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig för revision: Linda Rilby, barnmorska och KPO.

Verksamhetschef ansvarar för uppföljning av innehållet i rutinen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Obstetrix/Melior, om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl Pro.

## Granskare/arbetsgrupp

Annalen Dahlberg, Kvalitet och Patientsäkerhetsombud BB.

Granskare efter revidering: Linda Rilby, Kvalitet- och patientsäkerhetsombud (KPO). Camilla Olofsson, KPO. Lisbeth Rölfeldt KPO.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Riktlinje verkställighet

**Gäller för:** Verksamhet Obstetrik

**Innehållsansvar:** Linda Rilby, (linri1), Barnmorska

**Granskad av:** Erica Ginström Ernstad, (erigi2), Sektionschef

**Godkänd av:** Anneli Falk, (annfa17), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9786-1429723585-237

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2026-01-22

**Giltig till:** 2028-01-22