

Gäller för: Verksamhet Njurmedicin

Giltig från: 2026-03-09

Innehållsansvar: Karlo Mihovilovic, (karmi10), Överläkare

Giltig till: 2028-03-09

Godkänd av: Cecilia Rosander, (cecro3), Verksamhetschef

Läkemedel

Generella ordinationer för Dialysmottagningar inom SU

Rutinen gäller samtliga Dialysmottagningar inom SU

Revideringar i denna version

- Inf ACD-A iv vid LDL-behandling tillagt
- Maxdos av inf Albumin 20% är höjd till 200 ml/behandling-
- T Panocod borttagen

Syfte

Nedanstående läkemedel får administreras av sjuksköterska vid behov till vuxna patienter i dialys utan föregående särskild ordination för varje enskilt tillfälle.

Arbetsbeskrivning

OBS!

- Dessa ordinationer gäller endast vid tillfälligt behov och med noggrant beaktande av känd överkänslighet eller andra kontraindikationer hos varje patient. Givna läkemedel ska signeras i Melior. Vid regelbundet behov skall läkemedlet ordineras av läkare i Meliors läkemedelsmodul.
- Intravenösa injektioner och/eller infusioner som ges under behandling ska ges på vensidan.

OBS! Ansvarig sjuksköterska är skyldig att känna till Fassinformation om det aktuella läkemedlet innan det administreras till patient.

Läkemedel	Styrka	Normaldos	Maxdos/ behandling	Kontraindikation/anmärkning se även Fass
Vid smärta t. Diklofenak t. Paracetamol Inf. Paracetamol	50 mg 500 mg 1000 mg	50 mg 2 tabletter 100 ml	50 mg 2 tabletter 100 ml	Överkänslighet Överkänslighet Överkänslighet, ges på 10-15 min.
Vid oro t. Diazepam inj Diazepam rektalvätska Diazepam	5 mg 5 mg/ml 10 mg	1 tablett 0,5 ml 1 tub	2 tabletter 1 ml 1 tub	Sömnapné lågt BT vid HD Sömnapné lågt BT vid HD Sömnapné lågt BT vid HD
Slömlösande bt. Acetylcystein	200 mg	1 tablett	1 tablett	Överkänslighet

Läkemedel	Styrka	Normaldos	Maxdos/ behandling	Kontraindikation/anmärkning se även Fass
Vid rethosta mixt. Mollipect mixt. Cocillana-Etyfin		15 ml 5-10 ml	15 ml 10 ml	Andningsdepression
Vid illamående t. Primperan inj. Primperan iv inj. Ondansetron iv	10 mg 5 mg/ml 2 mg/ml	1 tablett 0,5 -1 ml 2 ml	1 tablett 2 ml 4 ml	2ml + 2ml
Vid magkatarr/ sura uppstötningar k. Omeprazol oral susp. Gaviscon	20 mg	1 kapsel 10 ml	2 kapslar 20ml	
Vid hypoglycemi inj. Glucos iv	300 mg/ml	Individuell	60 ml	
Vid benkramper inj. Addex NaCl iv	4 mmol/ml	5-10 ml	20 ml	
Vid diareé t. Dimor	2 mg	2 tabletter	2 tabletter	Skov i inflammatorisk tarmsjukdom
Lokalbedövning vid fistelpunktion inj. Xylocain ic spray Xylocain EMLA/ Tapin plåster/kräm	10 mg/ml 10 mg/dos	Individuell Individuell	1 ml	
Förebyggande under HD/PF/ABO samt vid blodtrycksfall inf. NaCl iv inf. Albumin iv Syrgas	9 mg/ml 200 g/l 2 l /grimma 5 l /mask	Individuell Individuell	500 ml 200 ml	KOL, astma, bleomycin- behandling
Vid hudirritation runt CDK-ingång K Fenuril-hydrokortison	1%	Stryks på i ett tunt lager		
Vid antikoagulations- fri dialys Inf NaCl	9 mg/ml	500-750 ml/h		När onlinevätska inte kan tillverkas. Ges med infusionspump

Läkemedel	Styrka	Normaldos	Maxdos/ behandling	Kontraindikation/anmärkning se även Fass
Kärlkateterlås för installation i CDK 1) Citraflow 2) TauroLockHep500 3) TauroLock Urokinas 25 000 U	46,7%	Enligt skänkellumen Enligt skänkellumen Enligt skänkellumen OBS! Blandas bedside		Val av lås utifrån CDK:n funktion, se rutin 'CDK-lås' Vid tveksam effekt av Citraflow eller TauroLock Urokinas kan den installerade volymen ökas med max 0,1 ml vilket sedan ska utvärderas och ordineras i Melior om den ökade dosen ska kvarstå. För TauroHep500 gäller 0,2 ml.
Vid allergiska reaktioner under dialys-/plasmaferes- och ABO-behandling inj Solu-Cortef iv	50 mg/ml	2 ml	2 ml	
Vid symtomgivande hypokalcemi i samband med plasmaferes- och ABO-behandling inj Zeltazin	100 mg/ml	5-10 ml	10 ml	Max 2 ml/min
För att förhindra koagulation av kolonn vid PF-/ABO-behandling och LDL-afes inf ACD-A iv		enligt schema/ ordination		

Ansvar

Rutinen gäller för sjuksköterskor.

Verksamhetschefen ansvarar för att läkargruppen informeras om nytillkomna och reviderade rutiner.

På delegation av verksamhetschefen ansvarar rutinansvarig sköterska för att samtlig personal på respektive dialysmottagning informeras om nytillkomna och reviderade rutiner.

Uppföljning och revision

Ansvarig för uppföljning och revision är på respektive dialysmottagnings rutinansvarig sjuksköterska i samråd med dialysansvarig överläkare.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Relaterad information

Fass
Bipacksedlar

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Njurmedicin

Innehållsansvar: Karlo Mihovilovic, (karmi10), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Rosander, (cecro3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9803-2137832294-37

Version: 11.0

Giltig från: 2026-03-09

Giltig till: 2028-03-09