

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi
Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare
Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-15

Läkemedel - Inhalationsläkemedel

BAKGRUND

Iordningsställande av läkemedel görs av sjuksköterska.
Undersköterska biträder sjuksköterska vid administrering av läkemedlet

LÄKEMEDEL

På TIVA används följande inhalationsläkemedel:

Acetylcystein® 200 mg/ml, 2ml (av koncentrerad vätska)
Acetylcystein lösning för nebulisator 200 mg/ml skall både i öppnad och oöppnad förpackning förvaras i kylskåp. Öppnad flaska är hållbar fyra veckor i kylskåp.

Arbeta aseptiskt. Ny kanyl och spruta inför varje dos. Märk alltid sprutan med färdigtryckt etikett som finns i läkemedelsrummet.

OBS! Acetylcystein får ALDRIG ges ensamt utan måste ges tillsammans med bronkvidgande läkemedel.

Atrovent® (ipratropium) 0.25 mg/ml 2 ml

Endosbehållarna förvaras i skydd för ljus i foliekuvertet.

Budesonid (Pulmicort) 0.5 mg/m 2 ml

Förpackade i kuvert om 5 x 2 ml. Efter att kuvertet öppnats är endosbehållarna hållbara i 3 månader. Endosbehållarna förvaras i skydd för ljus i foliekuvertet.

Ventoline® (salbutamol) 2 mg/ml 2.5 ml

Förpackade i kuvert om 10 x 2.5 ml. Efter att kuvertet öppnats är endosbehållarna hållbara i 3 månader. Endosbehållarna förvaras i skydd för ljus i foliekuvertet.

Combivent® (ipratropium /salbutamol) 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml

Endosbehållarna förvaras i skydd för ljus i foliekuvertet.

OBS! I FASS står det att Combivent inte ska blandas med andra läkemedel, men den kliniska erfarenheten är att det går att administrera Combivent 0,5 mg/2,5 mg tillsammans med Acetylcystein 200 mg/ml i samma nebulisator. På TIVA lutar vi oss mot den kliniska erfarenheten och ger Combivent tillsammans med Acetylcystein i nebulisator.

Alla dessa läkemedel är färdigspädda och någon tillsats av NaCl krävs ej. Överblivet innehåll i endosbehållare skall kasseras.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Inhalationskoppen är avsedd för 1-5 ml och vid kombinationer av läkemedel där totalmängden överskrider 5 ml måste doserna korrigeras.

För mer information om respektive läkemedel hänvisas till FASS

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1966

Version: 8.0

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-15