

Ukrainska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Поради та інформація про заспокійливі засоби при лікуванні зубів

Перед лікуванням

Важливо, щоб ви повідомили нам про будь-які захворювання або ліки, які ви приймаєте. Для правильного дозування нам також необхідно знати вашу вагу.

Важлива інформація

Як працює Мідазолам

- Ви розслабляєтеся і відчуваєте менше занепокоєння під час лікування.
- Препарат не є знеболюючим, і тому за бажанням ви можете отримати звичайну анестезію.
- Препарат впливає на здатність запам'ятовувати події, тому, можливо, ваші спогади про процедуру будуть менш чіткими.

Як вживається Мідазолам

- Препарат приймають в клініці за 20-30 хвилин до початку процедури.
- Зазвичай у вигляді розчину для пиття.
- Дітям іноді вводять препарат через клізму.

Важливо перед процедурою

Важливо не їсти і не пити за дві години до візиту. Обов'язково приходьте вчасно.

Важливо після процедури

Мідазолам залишається в організмі протягом усього дня. Після процедури потрібно буде залишатися в клініці від однієї до двох годин. Оскільки засіб розслаблює мускулатуру і впливає на рівновагу, важливо уникати фізичного навантаження і керування транспортними засобами у день процедури. Керувати автотранспортом можна не раніше, ніж через 12 годин. Вас повинен хтось супроводжувати після процедури та по дорозі додому з клініки.

Інформація для опікунів

Важливо під час процедури

Іноді буває так, що, незважаючи на ліки, дитина злиться або сумує, і тоді ви можете допомогти, підтримуючи і заспокоюючи її. Важливо, щоб після процедури ви підкреслили позитивні сторони події, щоб дитина запам'ятала саме це.

Важливо після процедури

На шляху додому у машині дитина повинна сидіти, як звичайно, в автокріслі з ременем безпеки, і поруч з нею повинен бути дорослий. Проведіть решту дня з дитиною вдома і тримайте дитину під наглядом, тому що ліки впливають на рівновагу. Якщо дитина засинає, їй слід лежати на боці.

Скільки коштує Мідазолам?

Така процедура вимагає додаткового часу в клініці. Це безкоштовно для дітей та молоді в рамках відповідної програми. З дорослих стягується плата відповідно до чинного прейскуранта. У разі пізньої відмови від процедури, або якщо ви не прийдете у призначений час, як з дітей, так і з дорослих стягується більш висока плата.

Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Inför behandling

Det är viktigt att vi känner till dina eventuella sjukdomar och mediciner. För att kunna dosera rätt behöver vi även veta vad du väger.

Det här behöver du känna till

Så fungerar Midazolam

- Du slappnar av och känner mindre oro under behandlingen.
- Läkemedlet är inte smärtstillande och därför kan du få bedövning som vanligt om du vill.
- Minnet av behandlingen är vanligtvis inte så tydlig efteråt eftersom medicinen tillfälligt påverkar förmågan att komma ihåg.

Så ges Midazolam

- Läkemedlet tas på kliniken 20–30 minuter före behandlingen.
- Vanligtvis i form av en lösning att dricka.
- Till barn ibland via en plastpip i ändtarmen.

Att tänka på före behandling

Det är viktigt att du inte äter eller dricker två timmar innan besöket. Tänk på att komma i god tid till besöket.

Att tänka på efter behandling

Midazolam finns kvar i kroppen under hela dagen. Efter behandlingen får du stanna kvar på kliniken i en till två timmar. Eftersom medlet verkar avslappnande på musku-laturen och påverkar balansen är det viktigt att inte delta i fysiska aktiviteter eller att ge sig ut i trafiken samma dag. Bilkörning är inte tillåten förrän efter tolv timmar. Du ska ha sällskap av en ledsagare direkt efter behandlingen och även senare på väg hem från kliniken.

Information till vårdnadshavare

Att tänka på under behandlingen

Ibland händer det att barnet trots medicinering blir argt eller ledset och då kan du hjälpa till genom att stötta och lugna. Det är viktigt att du efteråt ger en positiv bild av händelseförloppet då detta blir vad barnet kommer ihåg.

Att tänka på efter behandling

Vid hemresa i bil ska barnet sitta som vanligt i bilstol med säkerhetsbälte samt ha en vuxen bredvid sig. Ta det lugnt hemma med barnet resten av dagen och håll barnet under uppsikt eftersom balansen är påverkad. Om barnet somnar ska det ligga på sidan.

Vad kostar behandlingen med Midazolam?

Denna behandling kräver extra tid på kliniken. Den är kostnadsfri för barn och unga vuxna inom ramen för den fria barn- och ungdomstandvården. Vuxna debiteras enligt gällande prislista. Vid sena återbud och uteblivande debiteras en högre avgift för såväl barn som vuxna.