

Persiska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

توصیه و اطلاعات در مورد داروهای آرام بخش در درمان دندان

پیش از درمان

مهم است که در مورد بیماری های احتمالی شما و داروهایی که مصرف می کنید بدانیم. برای اینکه بتوانیم به درستی دوز مصرفی شما را تعیین کنیم باید وزن شما را نیز بدانیم.

اینها را شما باید بدانید

داروی میدازولام Midazolam اینگونه عمل می کند

- در طول درمان آرام می شوید و احساس اضطراب کمتری می کنید.
- این دارو مسکن نیست و از این رو در صورت تمایل می توانید طبق معمول از داروی بیهوشی استفاده کنید.
- خاطره درمان بطور معمول چندان واضح نیست زیرا دارو به طور موقت بر توانایی به خاطر سپردن تأثیر می گذارد.

چگونگی مصرف میدازولام

- دارو 20 تا 30 دقیقه پیش از شروع درمان در کلینیک مصرف می شود.
- معمولاً به صورت محلولی برای نوشیدن.
- برای کودکان گاهی اوقات از طریق یک لوله پلاستیکی در مقعد.

پیش از درمان به این موضوع توجه داشته باشید

مهم است که دو ساعت قبل از مراجعه غذا نخورید و نوشیدنی نیشامید. به یاد داشته باشید که کمی زودتر از وقت تعیین شده در مطب حاضر باشید.

بعد از درمان به این موضوع توجه داشته باشید

میدازولام در طول روز در بدن باقی می ماند. پس از درمان می توانید یک تا دو ساعت در کلینیک بمانید. از آنجایی که این محصول اثر آرامش بخشی بر روی عضلات دارد و بر تعادل تأثیر می گذارد، مهم است که در فعالیت های بدنی شرکت نکنید یا در همان روز رانندگی نکنید. رانندگی تا دوازده ساعت پس از مصرف این دارو مجاز نیست. شما باید بلافاصله پس از درمان و همچنین بعداً در راه خانه از کلینیک یک همراه داشته باشید.

اطلاعات برای سرپرست کودک

در طول درمان به این موضوع توجه داشته باشید

گاهی با وجود مصرف دارو، کودک عصبانی یا غمگین می شود. در این حالت شما می توانید با حمایت و آرام کردن او کمک کنید. مهم است که پس از آن تصویر مثبتی از سیر وقایع ارائه دهید زیرا این همان چیزی خواهد شد که کودک بعد به خاطر می آورد.

پس از درمان به این موضوع توجه داشته باشید

وقتی با اتومبیل به خانه می‌روید، کودک باید طبق معمول روی صندلی اتومبیل با کمربند بنشیند و یک بزرگسال در کنارش باشد. بقیه روز را در خانه با کودک استراحت کنید و او را زیر نظر قرار دهید زیرا تعادلش تحت تاثیر دارو قرار می‌گیرد. اگر کودک به خواب رفت، باید به پهلوی بخوابد.

هزینه درمان با میدازولام چقدر است؟

این درمان نیاز به زمان اضافی در کلینیک دارد. این روش درمانی در چارچوب خدمات دندانپزشکی برای کودکان و نوجوانان رایگان است. بزرگسالان طبق لیست قیمت هزینه می‌پردازند. در صورت انصراف دیر هنگام و حضور نیافتن هزینه بیشتری هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان دریافت خواهد شد.

Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Inför behandling

Det är viktigt att vi känner till dina eventuella sjukdomar och mediciner. För att kunna dosera rätt behöver vi även veta vad du väger.

Det här behöver du känna till

Så fungerar Midazolam

- Du slappnar av och känner mindre oro under behandlingen.
- Läkemedlet är inte smärtstillande och därför kan du få bedövning som vanligt om du vill.
- Minnet av behandlingen är vanligtvis inte så tydlig efteråt eftersom medicinen tillfälligt påverkar förmågan att komma ihåg.

Så ges Midazolam

- Läkemedlet tas på kliniken 20–30 minuter före behandlingen.
- Vanligtvis i form av en lösning att dricka.
- Till barn ibland via en plastpip i ändtarmen.

Att tänka på före behandling

Det är viktigt att du inte äter eller dricker två timmar innan besöket. Tänk på att komma i god tid till besöket.

Att tänka på efter behandling

Midazolam finns kvar i kroppen under hela dagen. Efter behandlingen får du stanna kvar på kliniken i en till två timmar. Eftersom medlet verkar avslappnande på musku-laturen och påverkar balansen är det viktigt att inte delta i fysiska aktiviteter eller att ge sig ut i trafiken samma dag. Bilkörning är inte tillåten förrän efter tolv timmar. Du ska ha sällskap av en ledsagare direkt efter behandlingen och även senare på väg hem från kliniken.

Information till vårdnadshavare

Att tänka på under behandlingen

Ibland händer det att barnet trots medicinering blir argt eller ledset och då kan du hjälpa till genom att stötta och lugna. Det är viktigt att du efteråt ger en positiv bild av händelseförloppet då detta blir vad barnet kommer ihåg.

Att tänka på efter behandling

Vid hemresa i bil ska barnet sitta som vanligt i bilstol med säkerhetsbälte samt ha en vuxen bredvid sig. Ta det lugnt hemma med barnet resten av dagen och håll barnet under uppsikt eftersom balansen är påverkad. Om barnet somnar ska det ligga på sidan.

Vad kostar behandlingen med Midazolam?

Denna behandling kräver extra tid på kliniken. Den är kostnadsfri för barn och unga vuxna inom ramen för den fria barn- och ungdomstandvården. Vuxna debiteras enligt gällande prislista. Vid sena återbud och uteblivande debiteras en högre avgift för såväl barn som vuxna.