Gäller för: Västra Götalandsregionen
Innehållsansvar: Monica Arvidsson, (monar3), Överläkare
Granskad av: Monica Arvidsson, (monar3), Överläkare
Godkänd av: Mona Andersson Palmqvist, (monpa7), Överläkare

Giltig från: 2022-08-25
Giltig till: 2024-08-25

Covid-19-vaccinering för patienter med tidigare känd allergi och överkänslighet

Utarbetad av överläkare Allergisektionen vid VO lungmedicin, allergologi och palliativ medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med chefläkare Närhälsan

Bakgrund

Dokumentet är framtaget av Allergisektionen Sahlgrenska universitetssjukhuset i samverkan med Primärvården. Det bygger på Svenska Föreningen för Allergologis (SFFAs) riktlinjer kring covid-19-vaccinering av personer med tidigare allergi och överkänslighet (www.sffa.nu).

Nytt sedan version 2:

- Handläggning av patienter som fått minst en dos covid-19-vaccin utan allergisk reaktion.
- Patienter med tidigare anafylaxi ska vaccineras med första dos inom öppenvård med läkarkompetens och utrustning för ev. anafylaxi, inte i tillfälliga vårdlokaler. Övervakning 30 minuter.
- Om patienten tidigare fått minst 1 dos utan allergisk reaktion kan nästföljande doser ges inom öppenvård, inklusive hos extern vaccinatör.
- Övervakning 15 min.

Vaccination vid Systemisk mastocytos, se nedan.

Anafylaxiberedskap krävs på alla vaccinationsmottagningar.

Med öppenvård menas vårdcentral och extern vårdgivare som vaccinerar utanför sjukhus.

Allmän bedömningsgrund gällande vårdnivå för vaccinering
Merparten av alla allergiker bedöms kunna vaccineras inom öppenvård. Risken för anafylaktiska reaktioner mot covid-19-vaccin bedöms som låg.
Luftvägsallergier: Patienter med luftvägsallergier mot pollen, pälsdjur, kvalster eller andra luftvägsallergener kan vaccineras inom öppenvård. Övervakning minst 15 minuter.

Födoämnesallergier: Patienter med födoämnesallergi kan vaccineras inom öppenvård, övervakning minst 15 minuter. Tidigare anafylaxi, se ruta ovan.

Bi-getingallergi: Patienter med bi-/getingallergi kan vaccineras i öppenvård, övervakning minst 15 minuter. Tidigare anafylaxi, se ruta ovan.

Latexallergi: Patienter med latexallergi kan vaccineras i öppenvård, övervakning minst 15 minuter. Tidigare anafylaxi, se ruta ovan.

Läkemedelsöverkänslighet: Patienter med tidigare överkänslighetsreaktioner mot läkemedel kan vaccineras i öppenvård, övervakning minst 15 minuter. Tidigare anafylaxi, se ruta ovan.

Undantag från första dos inom öppenvård: Om tidigare anafylaxi mot *injektionsläkemedel* eller upprepade anafylaxier mot *p.o* läkemedel, ska vaccination avvaktas och allergolog konsulteras**.** Om patienten tidigare fått minst en dos covid-19-vaccin utan allergisk reaktion, kan övriga doser ges inom öppenvård, med läkarkompetens och utrustning för ev. anafylaxi, inte i tillfälliga vårdlokaler.

Överkänslighetsreaktion vid tidigare vaccinering med andra vacciner: Patienter med tidigare lindriga/måttliga reaktioner (ej sjukhusvårdskrävande) mot något vaccin kan vaccineras inom öppenvård, övervakning minst 30 minuter. Vid tidigare anafylaxi mot något vaccin konsultera allergolog. Om patient fått minst en dos covid-19-vaccin utan reaktion kan nästföljande dos ges i öppenvård.

Reaktion vid tidigare dos av covid-19-vaccin: Patienter som fått allvarlig/anafylaktisk eller svårbedömbar reaktion vid tidigare dos av covid-19-vaccin ska **inte** ges ny dos av detta vaccin. Vaccinera ej, konsultera allergolog.

Angioödem: Patienter med angioödem kan vaccineras inom öppenvård, övervakning minst 15 minuter. Även patienter med hereditärt angioödem kan vaccineras inom öppenvård.

Systemisk mastocytos: Vaccinera ej, konsultera den specialistmottagning som normalt sköter patienten. Första dosen av covid-19-vaccin bör ges på sjukhus. Om ingen reaktion vid dos 1, kan patienten vaccineras inom öppenvård, med läkarkompetens och utrustning för ev. anafylaxi, inte i tillfälliga vårdlokaler**.**

Vid allergologkonsultation skriv i första hand remiss, ange telefonnummer till inremitterande.

Innehållsansvarig

Monica Arvidsson, överläkare Allergisektionen Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Regional medicinsk rutin

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: Monica Arvidsson, (monar3), Överläkare

Granskad av: Monica Arvidsson, (monar3), Överläkare

Godkänd av: Mona Andersson Palmqvist, (monpa7), Överläkare

Dokument-ID: HS9766-305841775-150

Version: 9.0

Giltig från: 2022-08-25

Giltig till: 2024-08-25