

1.
Förzigt miggen inträffa, liksom olycksbändelsen i allmänhet
ofantligt ofta till följd av slöthet.

Oförliga människor ha fått sätta livet till el. blivit
invalider på q. av. vådelighet med giftiga ämnen.

Fler ofta ha t. re. inte en mer fått böta för
hon varit överens med trätt luten i läst den alla fram
på ett land el. skol, kanske i en snygg el. knapp?
Barnet, som är stött på upptäckte frid, i för att det
finnes något däckbart, sätter knappen till munnen
i drickes av vinn hållet i för mun, sval, mat skuren
i mynne mer el. mindre illa brända. Anser om
särskilnas, uppkomman utbildningar i våra
skumpningar, särskilt i mat skuren, som
ofta bli skakt förtämd, vi att endast flytande
föde kan passera.

Ett giftigt el. skakt förtämd ämne får
aldrig förvaras i hül, d. bevaras för mat i slugh.

Ärskueligen olyckan ha uppkommit för förvärling
av medicin med giftiga kemiska ämnen så som
lysol, starka syror, sublimat m. m.

En flaska, ask el. överschuddat det här,
s. innehåller ett giftigt ämne, för aldrig vara utan
etikett i tydlig präkift med ämnets namn o
ordet gift!

Sebe heller för medicinflaska, burk, aska
m. m. i rikhet apoteksvaas förvaras, ingensin bevara
sin etiketter el. präkiftel.

Vid förgiftningfall är en snabb hjälp av nöden.
I den trändelse att läkare rike genast kan anberffas,
bör den nyt i sjukvård invidde, bärna till de vanligaste
i lämpligaste åtgärdena, d. skola vidtagas.

Om man vill rädda organismen från en god el
el. annat sätt ådages förgiftning, gälla följande
regler:

1. Giftet avtogs med en knapp förmedlet i kaktus
medel, Laccaria et. maggelpilning, det sistnämnda
förfarandet tillväg å enbart efter Laccarias ord.

Det lämpligaste kaktusmedlet är kaktusrot, Vinum
ipocacuanha, varav åt full vuxen givas 10-20 gr
åt yngre. Så ha vi grönslip till i kaktusrot
et. andra enblåa medel.

2. Injicering av ett motgift, d. gör giftet
overksamhet.

3. Giftet bindes genom ett indifferent ämne.

Subtila forskningarna i sön visa, att de förre
förfarandena äro gäddena för gift ämnens neutrali-
sering äro en veckas handföret just i de
sistnämnda metoder.

Tränns ämnen användas med fördel som
indifferenta bindmedel näml. vit lera (Pulvis alba)
et. djurhal (Carbo animalis). De givas i uppre-
pade doser av omkr 5 gr åt yngre, antingen

i subitans et. ut rōida i vatken. I den nya botten.
 Luren och. särskild djurkub. Därav blandas vatt.
 3 msk till $\frac{1}{4}$ lit bottenvatken. Giftämnet ab.
 sockers av kolet et. Luren i avzän jämte dessa
 que Luren handlen. Till det för mazzpalmis avsed.
 De vatt net sätter även en mest sked djurkub.
 Dessa brygg ännu två djurkub fallet vora vora
 i av för medicinelt bruk förskedd kvalitet.
 Alles! Viskol kan icke användas för detta ändamål!

~~Ofte kan den sjuken~~

Först vid akuta förgiftningar alltid genast
 kund på tillfälle med så nöjningsna upplysningar
 s. möjligt. Ofte kan den sjuken räddas åt livet
 que omhelt i räddig handling av den, i. först som
 mer tillstades. Vid tillfälle av hant kan det vara
 försänt att rädda den förgiftade, om icke tämplig
 för skäligt i skog redan tillräckligt blivit vidtagna.

För många fall, då gifftet intagits av misshägar,
 har en del därefter gånit spottats ut. Dylika fall
 äro därför icke så fuliga som de, då gifftet
 intagits frivilligt, ss vid sjöta-undersökning,
 där hela giftet antas förloradt i kapparen.

1) Först & främst avläggman alla obekväma ämnen
 där.

2) Låt icke bäddan koka upp i rummet! Från för
 allt böra flackor, öglas etc framme, icke bäddas,
 el. sköljas i tvättas. I dem kan det finnas rester
 av giftet, från vilket viktigaste slutsatser kunna
 drivas om frizistningens & därmed sammantaget
 de omständigheterna.

Skaffa frisk luft i rummet!

Frisk alltid böja ned på, vad den spåke trytt in!
 Det finns naturl. spår el. andra resten av det intagna
 i abstraktionerna om ej för man lugnt ställa frigen

till den djube. På länge spår en medeltande finis tron
hos den djube han man kappas på som, som skara
ofullständiga dock han ledde till blasket.

Om den fräziftade är medeltlös frischen man
vicka honom om kalla över tvättningen i tillräp
Frottning, varma krus o. o. v. smite ofta till
gripas samt om nödigt kausgjök andra.

Toto efter inhaget gift frist att älskadkamma
upphörning ant. om att sticka finger i kalen
på pat. (akta fingerarna!) el. tillhla m. en fjäde
giva han givut salt vatten att dricka!

Fluresappa, sft sappa, gjödde, via ägg
el. enbart äggvita är bra.

Käthmedel givas endast på läkars ord.

Om förgiftningar i hemmet

Förgiftningen inträffa liksom olyckshändelser i allmänhet ofantligt ofta till följd är slarv. Otaliga människor har fått rätta livet till eller blivit invalider på grund av vårdslöshet med giftiga ämnen. Hur ofta har till exempel inte en mor fått böta för hon varit ovarsam med tvättluten o låtit dem stå framme på ett bord eller stol, kanske i en mugg eller kopp? Barnet som är glatt på upptäcktsfärd, o tror att det finnes något drickbart, sätter koppen till munnen o dricker av innehållet o får mun, svalg, matstrupe o magsäck mer eller mindre illa brända. Även om såren läkas, uppkomma ärrbildningar å svåra skrumplingar, särskilt i matstrupen, som ofta blir starkt förträngd, så att endast flytande föda kan passera. Ett giftigt eller starkt frätande ämne får aldrig förvaras i kärl o korgar för mat o dryck. Oräkneliga olyckor har uppkommit genom förväxlingar av medicin med giftiga kemiska ämnen som karbol, lysol, starka syror, sublimat med mera. En flaska och eller överhuvudtaget det kärl som innehålla ett giftigt ämne får aldrig var utan etikett i tydlig påskrift med ämnet namn och ordet gift! Inte heller få medicinflaskan, burkar askar med mera i vilket apoteksvaror förvaras, någonsin berövas sina etiketter eller påskrifter.

Vid förgiftningsfall är snabb hjälp av nöden. I den händelse att läkare icke genast kan anträffas bör den något i sjukvård invigda känna till de vanligaste o lämpligaste åtgärderna, som skola vidtagas. Då man vill rädda organismen från en på ett eller annat sätt ådragen förgiftning gälla följande regler:

1. Giftet avlägsnas ur kroppen förmedelst kräkmedel, laxering eller magspolning, det sistnämnda förfarandet likväl endast efter läkares ordination.

Det lämpligaste kräkmedlet är kräkrot, Carapichea ipecacuanha, varav åt fullvuxen givas 10-20 gram åt gången. Så har vi grönsåpa bäst löst i ljummet vatten eller andra enklare medel.

2. Ingivning av ett motgift som gör giftet overksam.

3. Giftet binds genom ett indifferent ämne. Nutida forskning o rön visa att de tvenne förutnämnda åtgärderna för giftämne neutralisering äga en verkan just i den sistnämnda metoden. Tvenne ämnen använda med fördel som indifferent bindmedel nämligen vit lera (Bolus alba) eller djurkol (carbo animalia). De givas i uppdelade doser av vardera 5 gr åt gången, antingen i substans el. utrörda i vatten. I den nya litteraturen särskilt djurkol. Därav blandar vanligen 3 matskedar till 1/4 liter bittervatten. Giftämnet absorberas av kolet eller leran och avgår jämte dessa genom tarmkanalen.

Till det för magspoling avsedda vattnet sättas även en matsked djurkol. Dessa bägge ämnen höra självfallet vara rena o av för medicinskt bruk fodrad kvaliteter. Obs! Träkol kan icke användas för detta ändamål.

Sänd vid akuta förgiftningar alltid genast bud på läkare med så noggranna upplysningar som möjligt. Ofta kan den sjuke räddats åt livet genom snabb o rådig handling av den som först kommer tillstädes. Vid läkarens ankomst kan det vara för sent att rädda den förgiftade om icke lämpliga mått o steg, redan tidigare blivit vidtagna. I många fall, då giftet intagits av misstag, har en del därav genast spottats ut. Dylika fall äro därför icke så farliga som de, där giftet intagits frivilligt, så vid självmordsförsök, där hela giftsatsen förblivit i kroppen.

1. Först o främst avlägsna alla obehöriga åskådare

2. Låt icke bära bort något ur rummet. Framför allt bära flaskor o glas stå framme, icke borttaga eller sköljas o tvättas. I dem kan det finnas rester av giftet, från vilket viktiga slutsatser kunna dragas och förgiftningen o därmed sammanhängande omständigheter.

Skaffa frisk luft i rummet. Försök alltid taga reda på vad den sjuke tagit in! Det finns vanligen spår eller några rester av det intagna i omgivningen om ej får man lugnt ställa frågan till den sjuke.

Så länge spår av medvetande finnes kvar hos den sjuke kan man hoppas få svar som ehuru ofullständiga dock kan leda till klarhet.

Om den förgiftade är medvetslös försöker man väcka honom genom kalla övertvättningar o tillrop. Frotteringar, varma krus och så vidare måste ofta tillgripas samt om nödigt konstgjord andning.

Sök efter intaget gift först att åstadkomma uppkastning antingen genom att sticka fingret i halsen på patienten (akta fingrarna!) eller kittla med en fjäder. Giv han ljumt saltvatten att dricka! Havresoppa, saftsoppa, grädda, råa ägg eller endast äggvita äro bra. Kräkmedel givas endast på läkarens ordination.