

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22

Celocurin 50 mg/ml (suxametonium)

Indikation

Perifert verkande muskelavslappnande och kortverkande läkemedel.

Används vid t ex intubation, reposition av frakturer/luxationer och inför röntgen.

Administrationssätt

- i.v.
- i speciella situationer i.m. och i.o.
- anestesilog bör närvara vid administrering, slår ut all skelettmuskulatur inklusive andning. Intubationsmaterial, respirator och syrgas ska finnas tillgänglig vid administrering.
- patienten ska var arytmiövervakad och blodtryck följas.

Dosering

Vuxna: 1,0 – 1,5 mg/kg.

Barn: enligt läkarordination.

Biverkningar

Bradykardi, rytmrubbningar, blodtrycksfall, histaminfrisättning, stegring av serumkalium, muskelsmär, muskelömheter, ökning av intraokulärt tryck.

Kontraindikationer

Stora brännskador, massivt vävnadstrauma, njursvikt med serumkaliumökning, svår långvarig sepsis, svår hyperkalemi, tidigare känd överkänslighet mot succinylkolin, familjär malign hypertermi.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-1320169253-313

Version: 7.0

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22