

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Giltig från: 2025-12-22

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Giltig till: 2027-12-22

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Flera godkännare finns - se eftersättsblad

# Flumazenil 0,1mg/ml (flumazenil)

## Indikationer

Upphävande av bensodiazepinpåverkan.

## Administrationsätt

- I.v.
- I.v. infusion

## Spädning

- I.v. späds ej
- I.v. infusion: 20 – 50 ml Flumazenil späds med 500 ml NaCl 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml.

## Dosering

**Vuxna:** normaldos 0,3 - 0,6 mg.

Initialt ges 0,2 mg i.v. under 15 sekunder.

Om ej tillräcklig effekt inom 60 sekunder, ges ytterligare en dos på 0,1 – 0,2 mg. Kan vid behov upprepas till maxdos 2 mg.

**Barn:** enligt läkarordination. Försiktighet p g a begränsad erfarenhet.

## Biverkningar

Illamående, kräkningar, hudrodnader, palpitationer, ångest, oro.

## Kontraindikationer

Behandling av blandförgiftning då kramper eller svåra arytmier kan förekomma.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Akutmottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

**Granskad av:** Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

**Godkänd av:** Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare, Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10032-1320169253-319

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2025-12-22

**Giltig till:** 2027-12-22