

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Flera godkännare finns - se eftersättsblad

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22

Naloxon 0,4mg/ml (naloxon)

Indikation

Antidot. Andningsdepression orsakad av analgetika av morfintyp.

Administrationsätt:

- i.v.
- Kan även ges i.m. om i.v. ej går

Spädning

Spädes ej

Dosering

Vuxen: Initialdos 0,1 – 0,2 mg

Injektionen kan upprepas med 2 - 3 minuters intervall

Barn: Se dosschema barnakutvagn

Biverkningar

Yrsel, huvudvärk, takykardi, illamående, kräkningar.

Kontraindikation

Ges med försiktighet till patienter med beroende av substanser av opioidtyp på grund av risken för abstinenssyndrom.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare, Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-1320169253-336

Version: 4.0

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22