

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Giltig från: 2024-04-30

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Giltig till: 2026-04-30

Granskad av: Karin Johansson, (karnj5), Vårdenhetschef

Godkänd av: Bengt Asplén, (beasp1), Verksamhetschef

Adrenalin 1 mg/ml

Adrenalin 0,1 mg/ml (färdigspädd)

Indikationer

Hjärtstillestånd, astma, akut anafylaxi.

Administrationsätt

- intravenöst
- intraosseöst
- intracardiellt
- i endotrachealtub
- subkutant
- via nebulisator

Spädning

- intravenöst: använd Adrenalin 0,1 mg/ml
- intracardiellt: använd Adrenalin 0,1 mg/ml
- intraosseöst: använd Adrenalin 0,1 mg/ml
- subcutant: spädes ej
- nebulisator: enligt barnklinikens PM

Dosering

Vuxna:

- Hjärtstillestånd 1 – 2 mg i.v. eller dubbel dos i endotrachealtub
- Anafylaktisk chock 0,1 – 0,5 mg i.v. Om infart saknas 0,5 mg i.m.
- Allergi med svår astmatisk reaktion 0,1 – 0,25 mg i.v.
- Allergi med urticaria, Quinckes ödem 0,3 – 0,5 mg i.m., kan upprepas
- Astma 0,3 – 0,5 mg i.m. helst i upprepad deldos

Barn: enligt läkarordination.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Karin Rehnström, (karni5), Vårdenhetschef

Godkänd av: Bengt Asplén, (beasp1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-1320169253-358

Version: 3.0

Giltig från: 2024-04-30

Giltig till: 2026-04-30