

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Giltig från: 2026-04-29

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Giltig till: 2028-04-29

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Adrenalin 1 mg/ml

Adrenalin 0,1 mg/ml (färdigspädd)

Indikationer

Hjärtstillestånd, astma, akut anafylaxi och allergi.

Administrationsätt

- intravenöst (i.v.)
- intramuskulärt (i.m.)
- intraosseöst (i.o.)
- via nebulisator

Spädning

Intravenöst och intraosseöst: använd Adrenalin 0,1 mg/ml.

Dosering vuxen

- Hjärtstillestånd: **Adrenalin 0,1 mg/ml = 1 mg (10 ml)** i.v./i.o. enligt A-HLR läkemedel.
- Anafylaktisk chock med hypotension/medvetslöshet trots minst 2 doser adrenalin i.m: **utspätt Adrenalin 0,01 mg/ml** (Adrenalin 0,1 mg/ml 1 ml + NaCl 0,9% 9 ml), 0,01 - 0,05 mg i.v, **ges av läkare med god erfarenhet!**
- Anafylaxi med kraftig urtikaria: **Adrenalin 1 mg/ml**, 0,3 – 0,5 mg i.m. (0,3 – 0,5 ml), upprepa var 5:e – 10:e minut.
- Vid stridor: även inhalation **Adrenalin 1 mg/ml**: 2 ml + 2 ml NaCl 0,9%, upprepa vid behov.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-1320169253-358

Version: 4.0

Giltig från: 2026-04-29

Giltig till: 2028-04-29