

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22

Betapred 4 mg/ml (betametason)

Indikation

Status astmaticus, transfusionsreaktioner, pseudokrupp, hjärnödem och chock.

Administrations sätt

1. I.v. långsam injektion (1 minut)

Spädning

Vuxna: Späds ej vid i.v. **injektion**.

Vid intravenös **infusion** är Betapred blandbart med Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml.

Barn: Se barnklinikens PM

Dosering

Vuxna: 4 - 20 mg.

Barn: Enligt läkarordination.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-1320169253-389

Version: 4.0

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22