

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Flera godkännare finns - se eftersättsblad

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22

Fentanyl 50 µg/ml

Verksam substans

Fentanyl.

Indikation

Analgetikum vid kirurgiska och diagnostiska ingrepp samt som analgetikum vid intubering.

Administrationssätt

- i.v.
- **andningsdepressiv effekt. Får endast ges av anestesipersonal väl förtrogen med intubationsnarkos.**

Dosering

Vuxna: individuell dosering. Den analgetiska effekten av 100 µg (2 ml) är likvärdig med effekten av 10 mg Morfin.

Ungdomar 12 – 17 år: vuxendosering.

Barn: enligt läkarordination.

Biverkningar

Illamående, kräkningar, bradykardi, takykardi, blodtrycksfall, andningsdepression, apné, muskelrigiditet, yrsel, agitation, mios.

Kontraindikationer

Känd överkänslighet mot fentanyl eller andra opioider, sekretstagnation, andningsdepression.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare, Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-1320169253-406

Version: 5.0

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22