

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Flera godkännare finns - se eftersättsblad

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22

Labetalol 5 mg/ml

Verksam substans

Labetalol.

Indikation

Blodtryckssänkande läkemedel/svår hypertoni.

Administrations sätt

- i.v.ges under 3 – 5 minuter
- för att undvika postural hypotension ska patienten ligga ned 3 timmar efter i.v administrering samt övervakas noggrant och monitoreras.

Spädning

Späds ej.

Dosering

Vuxen: enligt läkarordination. Maxdos 200 mg (40 ml).

Barn: ---

Kontraindikationer

Okompenserad hjärtsvikt, försiktighet vid astma/obstruktiv lungsjukdom, instabil hjärtinsufficiens.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare, Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-1320169253-436

Version: 3.0

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22