

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Flera godkännare finns - se eftersättsblad

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22

Midazolam 1 mg/ml och 5 mg/ml

Verksam substans

Midazolam.

Indikationer

Sedering och anestesi.

Administrationsätt

- långsamt i.v. – ca 1 mg under 30 sekunder (vuxna)

Spädning

Blandbart med NaCl 9 mg/ml.

Dosering

Maxeffekt ca 5 – 10 minuter efter administrering.

Vuxen:

<60 år: 2 - 2,5 mg, rekommenderad totaldos 3,5 – 7,5 mg.

>60 år eller kroniskt sjuk patient: 0,5 – 1 mg, rekommenderad totaldos 3,5 mg.

Barn: se dosschema barnakutvagn eller tabell i FASS.

Biverkningar

Dåsighet och förlängd sedering, hudreaktioner, kardiovaskulära reaktioner, bronkospasm, anafylaktisk chock, ofrivilliga rörelser; agitation.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot bensodiazepiner eller något av hjälpämne, svår andningsinsufficiens eller akut andningsdepression

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare, Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-1320169253-443

Version: 4.0

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22