

Gäller för: Akutmottagning

Giltig från: 2026-09-23

Innehållsansvar: Divyen Sisodia, (divsi1), Överläkare

Giltig till: 2028-09-23

Granskad av: Divyen Sisodia, (divsi1), Överläkare

Godkänd av: Flera godkännare finns - se eftersättsblad

Doseringskort Noradrenalin (Svag 10 µg/ml)

Beredning

2,5mg Noradrenalin (1 mg/ml 2,5 ml) tillsättes till 247,5 ml Glukos 5% vilket ger en totalvolym på 250 ml och en koncentration på 10 µg/ml.

Skall kopplas till trevägskran med backventil mellan kran och infusion.

Bärardropp i form av Ringer Acetat sätts till ytterligare volympump och kopplas till trevägskran.

Administrering

Administrering i grov (grön) PVK, ej mer distalt än fossa cubiti. Vid oklarheter används ultraljud för att hitta kärl / bekräfta att pvk sitter bra.

Ges i volympump

- Infusionshastighet för Noradrenalin: Enligt doseringskort för att möta behandlingsmål
- Bärardropp går i 20ml/h vid sidan av Noradrenalininfusion.
- PVK som används för ovanstående skall inte användas för administrering av andra läkemedel.

Doser angivna i ml/h

Vikt (kg)	50	60	70	80	90	100	110	120
Dos								
0,01 µg/kg/min	3	4	4	5	5	6	7	7
0,02 µg/kg/min	6	7	8	10	11	12	13	14
0,04 µg/kg/min	12	14	17	19	22	24	26	29
0,06 µg/kg/min	18	22	25	29	32	36	40	43
0,08 µg/kg/min	24	29	34	38	43	48	53	58
0,10 µg/kg/min	30	36	42	48	54	60	66	72
0,12 µg/kg/min	36	43	50	58	65	72	79	86
0,15 µg/kg/min	45	54	63	72	81	90	99	108
0,20 µg/kg/min	60	72	84	96	108	120	132	144

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Divyen Sisodia, (divsi1), Överläkare

Granskad av: Divyen Sisodia, (divsi1), Överläkare

Godkänd av: Divyen Sisodia, (divsi1), Överläkare, Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-992003340-239

Version: 2.0

Giltig från: 2026-09-23

Giltig till: 2028-09-23