

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Divyen Sisodia, (divsi1), Överläkare

Granskad av: Divyen Sisodia, (divsi1), Överläkare

Godkänd av: Divyen Sisodia, (divsi1), Överläkare

Giltig från: 2025-09-01

Giltig till: 2027-09-01

Amiodaroninfusion (Cordarone)

Indikation

Allvarliga, recidiverande ventrikulära eller supraventrikulära arytmier, inklusive förmaksflimmer.

OBS: Vid A-HLR ges bolus via spruta enligt A-HLR algoritmen.

Kontraindikation

Höggradigt AV-block

Sjukdomar i sinusknutan (kan användas vid pacemaker).

Beredning

Ges som bolusinfusion respektive kontinuerlig infusion.

Cordaronebolusinfusion

2 ampuller à 3 ml Cordarone 50 mg/ml = 300 mg sätts till 244 ml Glucos 50 mg/ml vilket ger en totalvolym på 250 ml volym och en koncentration på 1,2 mg/ml.

Infusionshastighet: 500 ml/h. Sätts i volympump.

Cordaroneinfusion

3 ampuller à 3 ml Cordarone 50 mg/ml = 450 mg sätts till 491ml Glucos 50 mg/ml vilket ger en totalvolym på 500 ml volym och en koncentration på 0,9 mg/ml.

Infusionshastighet: 42 ml/h. Sätts i volympump.

Administrering

Grov (grön) PVK i högst 12 h.

Blandas med Glukos 50 mg/ml. Ska inte blandas med NaCl. Sätts i volympump.

Monitorering och observandum

Arytmiövervakning med blodtryckskontroll frekvent.

Potentierar Waran = ökad blödningsrisk.

Om möjligt ta thyroideavärden innan administrering pga risk för thyroideapåverkan.

Biverkningar

Kardiovaskulära

Hypotension, ffa i samband med snabb infusion. Bradykardi. Tromboflebiter

Thyroidea

Hypo- och hypertyreodism.

Lever

Övergående ökning av leverenzzymer

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Divyen Sisodia, (divsi1), Överläkare

Granskad av: Divyen Sisodia, (divsi1), Överläkare

Godkänd av: Divyen Sisodia, (divsi1), Överläkare

Dokument-ID: NU10032-992003340-248

Version: 3.0

Giltig från: 2025-09-01

Giltig till: 2027-09-01