

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-10-15

Giltig till: 2027-10-15

Atropin 0,5 mg/ml

Verksam substans

Atropin.

Indikationer

Bradykardi, hypersekretion av saliv, bronkialsekret och magsaft, peroperativ medicinering.

Administrationssätt

i.v.

Spädning

--.

Rimlig dos

Vuxna: 0,5 – 1 mg= 1 – 2 ml.

Barn: se e-Ped "Atropin 0,5 mg ml"

Biverkningar

Ökad hjärtfrekvens, muntorrhet.

Kontraindikationer

Känt tömningshinder av urinblåsan (prostataförstoring), svår ulcerös kolit, megakolon, paralytisk ileus.

Kontraindikationer är inte tillämpliga när atropin används i livshotande situationer (t.ex. bradyarytmi, förgiftning).

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Eva Mofjell, (evamo), Sjuksköterska, Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-992003340-341

Version: 1.0

Giltig från: 2025-10-15

Giltig till: 2027-10-15