

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-10-15

Giltig till: 2027-10-15

Glypressin 1 mg

Verksam substans

Terlipressin.

Indikationer

Blödande esofagusvaricer.

Administrations sätt

i.v.

Spädning

Pulver och vätska späds till en injektionslösning. Den sterila injektionsvätskan injiceras i injektionsflaskan med pulvret. Lösningen ska ges direkt i.v. efter beredning.

Rimlig dos

Vuxna: initialt 2 mg var 4:e timma.

Barn: --.

Biverkningar

Buksmärta, illamående, kräkningar, diarré, blekhet, bradykardi, bröstsmärta och arytmier.

Kontraindikationer

Graviditet, amning och septisk chock.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Eva Mofjell, (evamo), Sjuksköterska, Daniel
Velandar, (danve2), Sjuksköterska

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-992003340-343

Version: 1.0

Giltig från: 2025-10-15

Giltig till: 2027-10-15