

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-10-15

Giltig till: 2027-10-15

Propolipid 10 mg/ml

Finns i narkoskommoder i Akutrum 1, 2 och 3.

Verksam substans

Propofol.

Indikationer

Sedering vid kirurgiska och diagnostiska ingrepp. Induktion och underhåll av allmän anestesi.

Administrationsätt

- ges av läkare med god vana av sedering.
- omskakas före administrering – kan två olika lager ses efteråt, kassera emulsionen.
- i.v., långsam tillförsel tills kliniska tecken på anestesi observeras.
- används direkt, får ej sparas till senare.

Rimlig dos

Vuxna

Vid diagnostiskt/kirurgiskt ingrepp

- 0,5 – 1 mg/kg kroppsvikt under 1 – 5 minuter.

Vid allmän anestesi

- <55 år 1,5 – 2,5 mg/ kg kroppsvikt
- >55 år och/eller nedsatt hjärtfunktion 1 mg/kg kroppsvikt, 20 mg var 10:e sekund.

Barn: se e-Ped "Propofol intravenös inf/inj 10 mg/ml".

Biverkningar

Andningsdepression, hyperventilering, övergående apné, hosta, hicka, hypotension, bradykardi, takykardi.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot soja eller/och jordnötter.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Eva Mofjell, (evamo), Sjuksköterska, Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-992003340-344

Version: 1.0

Giltig från: 2025-10-15

Giltig till: 2027-10-15