

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-10-15

Giltig till: 2027-10-15

Bricanyl 0,5 mg/ml

Verksam substans

Terbutalin.

Indikationer

Lindring av bronkospasm vid bronkialastma, kronisk bronkit, emfysém eller andra lungsjukdomar.

Barn: Akut astma - tilläggsbehandling till patient som inte svarat på inhalerad luftrörsvidgande behandling och kortison.

Administrationsätt

- s.c.
- i.v.

Rimlig dos

Vuxna:

- s.c. 0,25 mg.
- i.v. 0,25 – 0,5 mg långsamt under 5 minuter.

Barn: se e-Ped "Terbutalin intravenöst".

Biverkningar

Tremor, hjärtklappning, huvudvärk, rastlöshet, urtikaria.

Kontraindikationer

--.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Eva Mofjell, (evamo), Sjuksköterska, Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-992003340-348

Version: 1.0

Giltig från: 2025-10-15

Giltig till: 2027-10-15