

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-10-15

Giltig till: 2027-10-15

Diazepam 5 mg

Verksam substans

Diazepam. Rektallösning. Koncentration 2 mg/ml.

Indikationer

Ångestdämpande, sederande, lugnande samt muskelrelaxerande.

Används vid pågående kramp och status epilepticus, steg 1.

Administrationssätt

Rektalt.

Rimlig dos

Vuxen: --.

Barn: enligt e-Ped "Diazepam rektalt".

Observandum

Vid krampbehandling av barn särskilt vid högre doser och vid upprepad dosering är kontroll av blodtryck och andning nödvändig, kan ge andningsdepression.

Kontraindikationer

Sömnapné syndrom, allvarlig andningsinsufficiens.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Eva Mofjell, (evamo), Sjuksköterska, Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-992003340-349

Version: 1.0

Giltig från: 2025-10-15

Giltig till: 2027-10-15