

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-10-15

Giltig till: 2027-10-15

Fenylefrin 0,1 mg/ml

Verksam substans

Fenylefrin.

Indikationer

För snabb höjning av blodtrycket i samband med t ex operation, regional anestesi.

Administrationssätt

i.v.

Rimlig dos

Vuxen: 50 µg (mikrogram) iv som bolusdos.

- normalt uppträder effekt inom 10 – 20 sekunder, om effekt ej uppnås kan dosen upprepas.
- ge aldrig mer än 100 mikrogram i en bolusdos.
- försiktighet vid uttalad arteroskleros.

Barn: --.

Biverkningar

Hypertension, reflexbradykardi, arytmier, anginasmärta, huvudvärk, lokal ischemi, upprymdhet, agitation.

Kontraindikationer

Svår hypertension.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Eva Mofjell, (evamo), Sjuksköterska, Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-992003340-350

Version: 1.0

Giltig från: 2025-10-15

Giltig till: 2027-10-15