

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-10-15

Giltig till: 2027-10-15

Furix 10 mg/ml

Verksam substans

Furosemid. Högdoserat loop-diuretikum, kort- och snabbverkande.

Indikationer

Akut lungödem, kardiella, renala och andra ödem, nedsatt njurfunktion.

Administrationsätt

i.v., injektionshastighet: ges max 4 mg/minut.

Rimlig dos

Vuxna: lungödem – initialt ges 4 ml=40 mg i.v.

Barn: se e-Ped "Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/ml".

Biverkningar

Hypovolemi, störningar i elektrolyt- och vätskebalans.

Kontraindikationer

Svår toxisk njurskada (vid högdosering), hotande eller manifest leverkoma.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Eva Mofjell, (evamo), Sjuksköterska, Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-992003340-351

Version: 1.0

Giltig från: 2025-10-15

Giltig till: 2027-10-15