OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Anestesi- operation- intensivvård
Innehållsansvar: Katarina Sisolakova, (katsi2), Överläkare
Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-09-18
Giltig till: 2028-09-18

Paracetamol + COX2 + opioid

Paracetamol

Återhämtningen och sårläkningen går snabbare om man kan börja röra sig så snart som möjligt efter operationen. Det är viktigt att förebygga smärta genom att ta smärtstillande läkemedel de första dagarna efter ingreppet.
Det är lämpligt att medicinera med Paracetamol som grundsmärtlindring. (Paracetamol är den verksamma substansen i Alvedon, Curadon, Panodil, Pamol, Reliv m fl). Tabletterna köper Du receptfritt på apoteket.
Du kan ta max …… mg ……..gånger/dygn.

Förutom grundsmärtlindring med receptfritt Paracetamolpreparat har din doktor ordinerat:

Etoricoxib (Arcoxia)- ett långverkande inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel (COX2).
Ta Etoricoxib ……. mg x 1. Det vill säga: ….. Tablett/er en gång dagligen.
Ta nästa dos kl ……

Du får med dig tabletter för de kommande två dygnen.

OBS! Etoricoxib tabletter får inte tas om Du är allergisk mot så kallade NSAID eller läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (t ex Magnecyl, Treo).
Om du redan äter någon annan NSAID eller så kallade COX2 hämmare (som t ex Ibumetin, Naproxen, Pronaxen, Orudis, Relifex, Brufen Retard, Celebra) ska du inte ta dessa (ev fråga din läkare).
Om din doktor vill att du ska ta Etoricoxib, ska du avstå från andra antiinflammatoriska läkemedel, eller ta det först efter 24 timmar efter du har tagit Etoricoxib.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

OxyCodone Depot (OxyContin, OxyCodone/Naloxone, Targiniq) - ett starkt långverkande smärtstillande, morfinliknandepreparat som kan kompletteras med grundsmärtlindringen.

Denna har smärtstillande effekt under ca 12 timmar.

Din doktor har ordinerat ett begränsat antal tabletter OxyCodone Depot. Ta tabletterna för att undvika svår smärta de första dagarna efter operationen.

OxyCodone Depot (OxyContin, OxyCodone/Naloxone): ….mg x 2 ggr/dag
Targiniq…..mg/….mg….st x 2 ggr dag

Ta nästa dos kl …..

OBS! OxyCodone Depot påverkar reaktionsförmågan och vakenheten. Kör inte bil när Du har tagit preparatet! Kombinera aldrig med alkohol.

Preparatet påverkar tarmrörligheten och kan ge förstoppning och illamående som biverkan. Förstoppning är oftast inget stort problem vid kortvarig behandling men om Du har känslig tarm kan Du kombinera med laxermedel,

OxyCodone (Oxynorm) - ett starkt smärtstillande, morfinliknandepreparat

Första dygnet efter operation kan Du behöva ta starkare smärtstillande preparat för att undvika svår smärta.

Din doktor har ordinerat ett begränsat antal OxyCodone tabletter att ta vid behov mot svår smärta.

Ta …… tablett OxyCodone à …… mg vid behov.
Ta …….. ml OxyCodone 1 mg/ml vid behov.

Ta nästa dos som <u>tidigast</u> kl ……..

OxyNorm har effekt under ca 6 timmar. Vänta minst 6 timmar innan Du tar en ytterligare kapsel Oxynorm. Ta högst 2 kapslar per dag.

OBS! OxyNorm påverkar reaktionsförmågan och vakenheten. Kör inte bil när Du har tagit preparatet! Kombinera aldrig med alkohol.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Anestesi- operation- intensivvård

Innehållsansvar: Katarina Sisolakova, (katsi2), Överläkare

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10033-657870698-100

Version: 8.0

Giltig från: 2026-09-18

Giltig till: 2028-09-18