

Gäller för: Anestesi- operation- intensivvård
Innehållsansvar: Katarina Sisolakova, (katsi2), Överläkare
Granskad av: Katarina Sisolakova, (katsi2), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-12-03

Giltig till: 2026-12-03

Paracetamol + opioid

Paracetamol

Återhämtningen och sår läkningen går snabbare om man kan börja röra sig så snart som möjligt efter operationen. Det är viktigt att förebygga smärta genom att ta smärtstillande läkemedel de första dagarna efter ingreppet.

Det är lämpligt att medicinera med Paracetamol som grundsmärtlindring. (Paracetamol är den verksamma substansen i Alvedon, Curadon, Panodil, Pamol, Reliv m fl). Tabletterna köper Du receptfritt på apoteket.

Du kan ta max mg gånger/dygn.

Förutom grundsmärtlindring med receptfritt Paracetamolpreparat har din doktor ordinerat:

OxyCodone Depot (Oxycontin, Oxycodone/Naloxone, Targiniq) - ett starkt långverkande smärtstillande, morfinliknande preparat som kan kompletteras med grundsmärtlindringen.

Denna har smärtstillande effekt under ca 12 timmar.

Din doktor har ordinerat ett begränsat antal tabletter OxyCodone Depot. Ta tabletterna för att undvika svår smärta de första dagarna efter operationen.

OxyCodone Depot (OxyContin, Oxycodone/Naloxone):mg x 2 ggr/dag
Targiniqmg/.....mg....st x 2 ggr dag

OBS! OxyCodone Depot påverkar reaktionsförmågan och vakenheten. Kör inte bil när Du har tagit preparatet! Kombinera aldrig med alkohol.

Preparatet påverkar tarmrörligheten och kan ge förstoppning och illamående som biverkan.

Förstoppning är oftast inget stort problem vid kortvarig behandling men om Du har känslig tarm kan Du kombinera med laxermedel, fråga på apoteket om lämpligt preparat.

OxyCodone (Oxynorm) - ett starkt smärtstillande, morfinliknande preparat

Första dygnet efter operation kan Du behöva ta starkare smärtstillande preparat för att undvika svår smärta.

Din doktor har ordinerat ett begränsat antal OxyCodone tabletter att ta vid behov mot svår smärta.

Ta tablett OxyCodone à mg vid behov.

Ta ml OxyCodone 1 mg/ml vid behov.

Ta nästa dos som tidigast kl

Oxynorm har effekt under ca 6 timmar. Vänta minst 6 timmar innan Du tar ytterligare kapsel Oxynorm. Ta högst 2 kapslar per dag.

OBS! Oxynorm påverkar reaktionsförmågan och vakenheten. Kör inte bil när Du har tagit preparatet! Kombinera aldrig med alkohol.

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Anestesi- operation- intensivvård

Innehållsansvar: Katarina Sisolakova, (katsi2), Överläkare

Granskad av: Katarina Sisolakova, (katsi2), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10033-657870698-103

Version: 5.0

Giltig från: 2024-12-03

Giltig till: 2026-12-03