

Gäller för: Anestesi-operation-intensivvård gemensam

Innehållsansvar: Jan Creutz, (jancr), Överläkare

Granskad av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2024-12-16

Giltig till: 2026-12-16

Svår luftvägsvagn, innehållsförteckning

Revidering i denna version

Ingen revidering

Bakgrund

Innehållsförteckningen har upprättats för att garantera att innehållet i alla an/op/iva-klinikens "Svår luftvägsvagn" ska innehålla samma utrustning.

Vagnarna ser fysiskt inte lika ut, vilket gör att utrustningen kan placeras något olika i respektive vagn. Placeringen av utrustningen ligger dock alltid så att utrustning för "lättare luftväg" ligger i översta lådan och desto "svårare luftväg", desto längre ned i vagnen ligger utrustningen, i lådan längst ned ligger utrustning för koniotomi.

Ledare för att hantera luftväg hänger bak på vagnarna.

Syfte

Att skapa ett standardiserat innehåll i luftvägsvagnarna på kliniken

Vilka berörs

Läkare, sjuksköterskor AnOpIVA

Rutin

V g se nästa sida.

Svår luftvägsvagn, innehållsförteckning

”Kryddhylla” (finns inte i alla vagnar)		Fortsättning låda 3	
	Sprutor 10ml + 2ml		Avsvällande
	Imskydd,		Otrivin 1 mg/ml nässpray
	Tub med Xylocaingel		
	Bronkoskopnippelar till arbetskanal		Lidocain/ Nafacolin 34 mg/ml + 0,17 mg/ml
	Bitstycken		Ask med tamponder
	Vinkelanslutning till tub/trach		Nästång för inläggning av tamponad
	Reservbatteri		1 st steril sax
Låda 1			1 st steril peang
	2 st Magillstång liten + stor		1 st gummispattel
	3 st Kantareller 26, 30, 34		
	3 st svalgtuber grön, gul, röd 2 st Rusch super safety clear 5, 6 (långa)		
	4 st Rusch flex spiraltub 5, 6, 7, 8		Låda 4
	1 st Formbar ledare		Minitrach
	1 st ”Brun” dilaterande ledare		3 pkt sterila kompresser
	1 st Frova intubationsledare (Cook, 8 Fr, blå) 1st Glideskop blad nr:3 gulmärkt 2st Magills tång för glideskop. Liten + stor		Cook Melker nødtrach nr 5 med cuff Xylocain gel 20 mg/ml
Laryngoskop			2 pkt sterila tork
	1 st handtag standard	}	1 st nässpekula 5 cm
			Laddas 1 g/v
	1 st handtag kort ”stubbe”		+
Laryngoskopblad			Testas med
	2 st blad Macintosh nr 3,	}	bladen
	2 st blad Miller rak 1, 2		1 st skalpell
	2 st blad Flexitip 3, 4		1 st trach nr 8
			Ventrain - handhållen jetventilation
			1st tracheal kanyl till ventrain (orange)
Låda 2			
	3 st Igel larynxmasker nr 3, 4 och 5		klorhexidin 5 mg/ml
	3 st Ambumask med bitstycke (engångs) strl. 3, 4, 5		2 st sterila engångsdukar
	3 st Xylocaingel		2 st NaCl 10 ml
			2 st sprutor 10 ml

	Låda 3	
	Inhalationsmask	Luftvägsledare – hänger på vagnen
	2 st svalgtuber, delbara för fiberintubation 9, 10	Ledere för byte av Lm till tub:
	2 st sugslang för bronkoskop	Aintree intubation catheter (C-CAE. 19.0-56-AIC)
	1 st steril handduk	Intubationskateter/ledare:
	2 st steril skål B6, B8	Cook 8F gul (C-CAE 8,0 – 35 – F11 – WCE)
	3 pkt kompresser	Cook 14 F blå (C-CAE-14,0 – 70 – F11 – WCE)
	Lokalanestesi	Exchangekateter:
	Lidokain hydroklorid 40 mg för transtracheal inj eller inhalation	Cook 8 Fr 45 cm (C-CAE - 8.0 - 45)
	Xylocain 10 mg/ml för injektion iv.	Cook 11 Fr 83 cm (C-CAE – 11,0 – 8,3)
	Xylocain spray 100 mg/dos	Cook 14 Fr 83 cm (C-CAE – 14,0 – 83)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi-operation-intensivvård gemensam

Innehållsansvar: Jan Creutz, (jancr), Överläkare

Granskad av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10033-657870698-53

Version: 6.0

Giltig från: 2024-12-16

Giltig till: 2026-12-16