

Gäller för: Anestesi- operation- intensivvård
Innehållsansvar: Katarina Sisolakova, (katsi2), Överläkare
Granskad av: Katarina Sisolakova, (katsi2), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-12-12

Giltig till: 2026-12-12

Paracetamol + COX2

Paracetamol

Återhämtningen och sår läkningen går snabbare om man kan börja röra sig så snart som möjligt efter operationen. Det är viktigt att förebygga smärta genom att ta smärtstillande läkemedel de första dagarna efter ingreppet.

Det är lämpligt att medicinera med Paracetamol som grundsmärtlindring. (Paracetamol är den verksamma substansen i Alvedon, Curadon, Panodil, Pamol, Reliv m fl). Tabletterna köper Du receptfritt på apoteket.

Du kan ta max mggångar/dygn.

Förutom grundsmärtlindring med receptfritt Paracetamolpreparat har din doktor ordinerat:

Etoricoxib (Arcoxia)- ett långverkande inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel (COX2).

Ta Etoricoxib mg x 1. Det vill säga: Tablett/er en gång dagligen.

Ta nästa dos kl

Du får med dig tabletter för de kommande två dyggen.

OBS! Etoricoxib tabletter får inte tas om Du är allergisk mot så kallade NSAID eller läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (t ex Magnecyl, Treo).

Om du redan äter någon annan NSAID eller så kallade COX2 hämmare (som t ex Ibumentin, Naproxen, Pronaxen, Orudis, Relifex, Brufen Retard, Celebra) ska du inte ta dessa (ev fråga din läkare).

Om din doktor vill att du ska ta Etoricoxib, ska du avstå från andra antiinflammatoriska läkemedel, eller ta det först efter 24 timmar efter du har tagit Etoricoxib.

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Anestesi- operation- intensivvård

Innehållsansvar: Katarina Sisolakova, (katsi2), Överläkare

Granskad av: Katarina Sisolakova, (katsi2), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10033-657870698-99

Version: 6.0

Giltig från: 2024-12-12

Giltig till: 2026-12-12