

Utskrivning från avdelning 23 - patienter som tidigare vårdats på avdelning 34

För att säkerställa att utskrivningsrutin följs på avdelning 23 gällande patienter, som överförts från avdelning 34, Neonatal har detta dokument upprättats.

Innan utskrivning till hemmet ska följande ha utförts:

PKU

Hörselscreening/ABR – ta kontakt med avdelning 34 som utför testet.

Kontroll Pulsoximetri (POX) höger hand och fot. Förs in av utförare i Melior under mätvärden.

Utskrivningsvikt, längd och huvudomfång förs in i Melior.

Efter eventuell ordination av ansvarig läkare - Administrera Beyfortus, RS-profylax. Skriv in Batch-nummer och var läkemedlet har getts i utdelningskommentar i Melior. Skriv Administrativ anteckning i Melior under profylax, alternativ rutin via BUM.

Utskrivande läkare skriver utskrivningslängd-, vikt och huvudomfång, PKU taget, RS-profylax ja eller nej givits på FV2 i Obstetrix.

Utskrivande läkare tillser att eventuell uppföljning enligt neonatala uppföljningsprogrammet planeras genom kommunikation med medicinsk sekreterare avdelning 34.

Kopia på läkarepikris + FV2 skickas till BVC av medicinsk sekreterare på avdelning 23.

Diagnoser och åtgärder registreras på FV2 av medicinsk sekreterare på avdelning 23.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Avdelning 23 NÄL

Innehållsansvar: Susanne Bengtsson Lund, (susbe5),
Vårdenhetschef

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10035-1983749542-396

Version: 1.0

Giltig från: 2025-11-04

Giltig till: 2027-11-04