

Gäller för: Avdelning 23 NÄL

Innehållsansvar: Ann Olsson, (annol7), Överläkare

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-05-16

Giltig till: 2026-05-16

Brännskador av barn och ungdomar på akutmottagningen NÄL

Ge **ordentligt** med smärtlindring redan på akutmottagningen

- **Laddningsdos** med Paracetamol = 40 mg / kg / dos, MAX 1500 mg, i första hand p.o. i andra hand rektalt
OBS ! Aldrig laddningsdos när man ger Paracetamol i.v.
- NSAID = 10 mg / kg / dos, p.o eller rektalt
- Oxynorm = 0,2 mg / kg / dos p.o. vid behov

Om barnet är väldigt smärtpåverkat – sätt **EMLA** eller **Maxilenekräm** (från 1 månads ålder, ej till jordnöts- / sojaallergiker) på ett par ställen.

Obs en ord på Midazolam (se spec. PM) skall finnas så att det kan ges på avd vid behov inför omläggning

Efter läkarbedömning av skadorna **skall** barnet till avd 23 alt. barnmottagningen för bad och omläggning, det är därför viktigt att barnet är väl smärtlindrat innan det kommer dit.

Barnet behöver oftast inte läggas in och fortsatt handläggning sker via barnmottagningen NÄL, kan vända sig till avd 23 på jourtid v.b.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Avdelning 23 NÄL

Innehållsansvar: Ann Olsson, (anno17), Överläkare

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10035-986315719-102

Version: 6.0

Giltig från: 2024-05-16

Giltig till: 2026-05-16