

Gäller för: Barn- och ungdomssjukvård, Avdelning 34 NÄL
Innehållsansvar: Peder Helmersson, (pedhe), Överläkare
Godkänd av: Magdalena Stensgaard, (magst14), Medicinsk sekreterare

Giltig från: 2024-09-02
Giltig till: 2026-09-02

Höglkoncentrerade trombocyter till nyfödda

Bör användas i första hand. Kan tillredas/beställas kl 07-21.

Innehåller ungefär dubbelt så många trombocyter per volymenhet. Ger alltså en mindre volymbelastning och kan minska antalet givna transfusioner.

Beredes på blodcentralen, dvs måste beställas i varje enskilt fall. Beredning tar 4 tim.
Hållbarhet 6 tim efter att de är klara.

Kl 21-07 fås som regel vanliga trombocyter och kan då användas i akuta situationer. Om ej så akut, kan man vänta till nästa morgon. Kliniken får avgöra. Samma sak gäller förstås dagtid att först ge vanliga trombocyter, om man anser att transfusion ej kan vänta 4 tim.

Höglkoncentrerade trombocyter ges på samma sätt som vanlig trombocyttransfusion.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Barn- och ungdomssjukvård, Avdelning 34 NÄL

Innehållsansvar: Peder Helmersson, (pedhe), Överläkare

Godkänd av: Magdalena Stensgaard, (magst14), Medicinsk sekreterare

Dokument-ID: NU10035-986315719-118

Version: 9.0

Giltig från: 2024-09-02

Giltig till: 2026-09-02