

Gäller för: Avdelning 34 NÄL

Innehållsansvar: Sofia Hedlund, (sofhe29), Teamledare

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-09

Giltig till: 2028-03-09

Lavemang Neonatal

Åtgärder

Utföres efter läkarordination av ansvarig sjuksköterska

Behandling

Om barnets tillstånd i övrigt tillåter ges Glukos 30% p.o. till barnet.

Material:

- Tappningskateter Nelaton nr: 10 eller 12
- Nippel
- Luer Lock Spruta 10 ml.
- Vaseline
- NaCl (9mg/ml), värms i ljummet vatten.

Genomförande:

Koksaltslavemang.

- NaCl, volym ordinerar av läkare. Kom ihåg att värma upp lösning och fyll katetern med NaCl.
- Tappningskateter (för kvinnor) för prematurer nr: 10, fullgångna nr: 12. Klipp inte av katetern då änden blir vass och kan medföra perforationsrisk.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

- Nippel och luer lock spruta i lämplig storlek.
- Vaseline.
- Spruta in lavemanget långsamt
- Dra ut sonden och håll ihop skinkorna någon minut så att koksaltet får verka.
- OBS! Forcera ej om motstånd. Det ska vara lätt att föra in katetern.
- Återupprepande av denna behandling först efter samråd med ansvarig läkare.
- Dokumentera i barnets journal.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Avdelning 34 NÄL

Innehållsansvar: Sofia Hedlund, (sofhe29), Teamledare

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10035-986315719-152

Version: 6.0

Giltig från: 2026-03-09

Giltig till: 2028-03-09