

Gäller för: Barn- och ungdomssjukvård, Avdelning 23 NÄL  
Innehållsansvar: Camilla Cederlund, (camce), Barnsjuksköterska  
Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-13

Giltig till: 2028-03-13

# Perianalabscess, avdelning 23

## Bakgrund

Abscess som bildas pga. infektion i de slemproducerande körtlarna kring anus. Kan även orsakas av infekterade hårfolliklar eller utgå inifrån rektum.

Incision och dränering av abscess görs på operation.

## Symtom

- Dov, molande smärta i analregionen.
- Feber
- Kraftigt ömmande rodnad om abscessen går mot hudytan
- Svårt att sitta

## Åtgärder

Efter operation kan omläggningsmaterialet avlägsnas i samband med dusch, och det kan därefter räcka med att sårhålan duschas morgon och kväll för att läkningen ska ske inifrån och ut.

Vid ev. omläggning kontinuerligt:

Smärtlindring innan varje omläggning samt v.b. – per os och även lokalt som buffrad Xylocain i sårhålan.

Låt patienten duscha bort befintligt förband. Spola sårhålan först, därefter välj omlägningsmaterial enl. läkarord.

## Uppföljning

Spola sårhålan morgon och kväll samt efter toalettbesök till läkning. Smärtlindring med Alvedon och Ipren. Återbesök efter 6–8 veckor till kirurg.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Barn- och ungdomsvård, Avdelning 23 NÄL

**Innehållsansvar:** Camilla Cederlund, (camce),  
Barnsjuksköterska

**Godkänd av:** Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10035-986315719-194

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2026-03-13

**Giltig till:** 2028-03-13