

Gäller för: Barn- och ungdomssjukvård, Barn- och ungdomsmottagning lekterapi -

Giltig från: 2026-01-22

Skola NÄL

Giltig till: 2028-01-22

Innehållsansvar: Tor Moberg, (tormo1), Specialistläkare

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Prolongerad ikterus hos spädbarn

Syfte

Att säkerställa en patientsäker och resurseffektiv handläggning av spädbarn med prolongerad ikterus.

Bakgrund

Ikterus som kvarstår 2-4 veckor efter födseln är en vanlig orsak till besök på barnmottagning. Enligt nationella riktlinjer ska alla barn med ikterus vid 2 veckors ålder bedömas strukturerat och utredning ska vara klar innan 4 veckors ålder. Det finns sedan april 2025 ett nationellt flödesschema för bedömning av patienter med prolongerad ikterus.

Handläggning

Spädbarn som kommer för frågeställningen prolongerad ikterus ska bedömas av ssk i enlighet med nationell riktlinje som hittas längst ned i detta dokument, eller på

<https://gastro.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/10/2025/04/Prolongerad-gulsot-SPGHN-algoritm.pdf>

Spädbarn som kommer med såväl som utan remiss där den enda frågeställningen är prolongerad ikterus bedöms och provtas av ssk. För välmående barn med normal provtagning och sannolikt bröstmjölksorsakad gulsot behöver läkare ej involveras utan handläggningen kan ske helt av ssk. Provsvar läggs till dagbakjour för signering, men bedöms av ssk. Dagbakjour ska inte involveras i övrigt vid normala provsvar. Vid avvikande provsvar sätts patienten upp till primärjoursläkare för vidare handläggning. Vid bilirubin 200-299 där ny provtagning ska bokas efter 3-4 veckor så bokas även denna provtagning in till ssk.

Vid andra frågeställningar än prolongerad ikterus, som exempelvis utebliven viktuppgång, träffar patienten alltid läkare. Flödesschemat och

denna riktlinje kan användas för barn upp till 8 veckors ålder. Äldre barn än så sätts upp till läkare på dagjouren.

Referenser och relaterade dokument


Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition, Prolongerad gulsot hos nyfödda,

<https://gastro.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/10/2025/04/Prolongerad-gulsot-SPGHN-algoritm.pdf>, 2025-08-05



Prolongerad gulsot hos nyfödda

Steg 1




* Utredningen bör vara klar före fyra veckors ålder. Notera att praktiska eller logistiska utmaningar vid provtagning, till exempel hemolys, kan fördröja handläggningen – det är därför viktigt att se till att tempot upprätthålls.



Prolongerad gulsot hos nyfödda

Steg 2



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Barn- och ungdomssjukvård, Barn- och ungdomsmottagning lekterapi - Skola NÄL

Innehållsansvar: Tor Moberg, (tormo1), Specialistläkare

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10035-986315719-204

Version: 8.0

Giltig från: 2026-01-22

Giltig till: 2028-01-22