

Gäller för: Barn- och ungdomssjukvård

Innehållsansvar: Rikard Arkel, (rikar2), Överläkare

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-11-27

Giltig till: 2026-11-26

# Infliximab vid IBD - Behandlingsplan

---

## Sammanfattning/syfte

Tillvägagångsätt vid behandling med Infliximab hos IBD- patienter.

## Åtgärder

- \* Kontrollera att patienten inte har tecken på infektion/feber.
- \* Längd och viktkontroll.
- \* Kontrollera att patienten tagit premedicin i hemmet (Alvedon och Aeries/Loratadin).
- \* PVK och blodprovstagning; SR, CRP, orosmukoid, blodstatus med diff, Na, K, kreatinin, albumin, ALAT, ASAT, GT, ALP, bilirubin, pancreasamylas.
- \* Blodtryck x 3, före, under och efter infusionen.
- \* Blanda Infliximab i 250 ml enl. ordination. Familjen ringer kl. 08:00 och bekräftar att barnet är friskt.
- \* De 3 första infusionerna Infliximab administreras iv. under 2 timmar enligt upptrappningsschema:

10 ml/h i 15 min

20 ml/h i 15 min

40 ml/h i 15 min

80 ml/h i 15 min

150 ml/h i 30 min

250 ml/h

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Efterföljande infusioner ges på 1 timma, 250 ml/h.

**OBSERVERA!** Vid ev. akut infusionsreaktion ska Infliximabfusionen avbrytas och läkare tillkallas!

Kvarstanna 1 timma efter avslutad infusion.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Barn- och ungdomssjukvård

**Innehållsansvar:** Rikard Arkel, (rikar2), Överläkare

**Godkänd av:** Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10035-986315719-216

**Version:** 11.0

**Giltig från:** 2024-11-27

**Giltig till:** 2026-11-26