

Gäller för: Avdelning 23 NÄL, Barn- och ungdomssjukvård
Innehållsansvar: Camilla Cederlund, (camce), Barnsjuksköterska
Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-13

Giltig till: 2028-03-13

Spikad femurfraktur - omhändertagande av barn

Sammanfattning/syfte

Rutiner på avdelningen och inför hemgång. Barn från förskoleåldern och uppåt. Många gånger går barnen direkt till operation och kommer till avdelningen för eftervård.

Åtgärder **För att snabbt kunna mobiliseras** är dessa barn i behov av **adekvat smärtlindring**, som ska ordinerats av läkare.

- Basmedicinering med Paracetamol + NSAID
- Targiniq
- Ev. PCA-pump med morfin de första dygnet
- Smärtskatta
- Utvärdera
- Vid otillräcklig effekt, kontakta läkare

Kontroller på avdelningen

- Dessa barn kan blöda per- och postoperativt. Kontrollera Hb vid behov
- Inspektera förband och förstärk/byt v.b.
- Förebygg förstoppning
- Om PCA-pump – övervakning enligt protokoll
- Kontroll-rtg post op.
- Om benet är gipsat görs kontroller av cirkulation i foten
- Inspektion av op.sår inför hemgång, suturer?

Informera om **vikten av mobilisering!**

- Får belasta enl ordination
- Kontakt med sjukgymnast och arbetsterapeut för träning och hjälpmedel

Inför hemgång

- Intyg för skolskjuts
- Intyg för gymnastik
- Intyg för vård av barn

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

- Återbesök?
- Ordna med suturtagning på hemort
- Råd om fortsatt smärtlindring i hemmet/Recept
- Lämna med gipsinstruktioner v.b.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Avdelning 23 NÄL, Barn- och ungdomssjukvård

Innehållsansvar: Camilla Cederlund, (camce),
Barnsjuksköterska

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10035-986315719-240

Version: 8.0

Giltig från: 2026-03-13

Giltig till: 2028-03-13