

Gäller för: Barn- och ungdomssjukvård, Avdelning 23 NÄL
Innehållsansvar: Camilla Cederlund, (camce), Barnsjuksköterska
Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-13

Giltig till: 2028-03-13

Bukobservation, avdelning 23

Bakgrund

Buksmärtor hos barn kan vara svårbedömt då det kan ha utlösts av en rad olika sjukdomar. Små barn förlägger också ofta buksmärtan till naveltrakten, oavsett orsak. Många läggs in för fortsatt observation, provtagning och utredning på avdelningen.

De vanligaste orsakerna till buksmärtor hos barn är bl a:

förstoppning, appendicit, körtelbuk, pneumoni, invagination, gastroenterit, UVI, inflammatorisk tarmsjukdom, etc.

Åtgärder

- Noggrann anamnes, framförallt av nutrition, elimination, smärta, aktivitet.
- Fasta initialt, i.v. vätska enligt vikt
- Pvk. Provtagning av blod, urin, ev faeces.
- Tempkontroller
- Smärtlindring endast efter läkarordination
- Ompalpatation
- Ev ultraljud-, röntgenundersökningar
- Konsulter ex barnmedicin, gyn.

Behandling

Utifrån ställd diagnos avgör patientansvarig läkare fortsatt behandling.

Ex operation, antibiotika, klyx, smärtlindring

Inför hemgång

Bör barnet uppleva förbättring, kunna försörja sig per os samt att planering finns för fortsatt tillfrisknande i hemmet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Barn- och ungdomssjukvård, Avdelning 23 NÄL

Innehållsansvar: Camilla Cederlund, (camce),
Barnsjuksköterska

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10035-986315719-66

Version: 7.0

Giltig från: 2026-03-13

Giltig till: 2028-03-13