

Gäller för: Barn- och ungdomssjukvård

Giltig från: 2024-11-26

Innehållsansvar: Rikard Arkel, (rikar2), Överläkare

Giltig till: 2026-11-26

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Celiaki utredningskrav före eventuell gastroskopi

- Anamnes inkl hereditet för autoimmuna sjukdomar.
- Tillväxtkurva.
- Relevanta blodprover inklusive Transglutaminas IgA för alla barn och ungdomar oavsett ålder. Tänk på att kontrollera att IgA-brist ej föreligger. Gliadin IgA ak tas ej längre rutinmässigt.
- Diagnos celiaki kan ställas utan gastroskopi om Transglutaminas IgA vid 2 separata tillfällen är 10-faldigt förhöjda jämfört med övre normalvärdet, i vårt fall 70 eller högre.
- Vid symtom som föranleder misstanke om celiaki och negativa celiakimarkörer i blodprov, kontrolleras HLA genotyp (HLA DQ2/DQ8) före ev. gastroskopi.
- Om tveksamheter gällande provsvar diskutera med gastroprofilerad barnläkare/endoskopist.

För mer utförlig dokumentation hänvisas till Vårdprogram för *Celiaki hos barn och ungdomar*, Svenska föreningen för pediatrik gastroenterologi, hepatologi och nutrition.

2022-11-15

Rikard Arkel

Tom Nicolajsen

Linn Fransson

Överläkare

Överläkare

Specialistläkare

Victor Gustafsson

Specialistläkare

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Barn- och ungdomssjukvård

Innehållsansvar: Rikard Arkel, (rikar2), Överläkare

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10035-986315719-71

Version: 8.0

Giltig från: 2024-11-26

Giltig till: 2026-11-26